

張氏醫通

張氏醫通卷之十三

長洲石張

璐路王父

纂

另

登誕先

叅訂

倬飛疇

諸家類集方藥皆隨論次第是編逐門但隸專方
其藉古方加減各門可以通用者彷彿祖劑之義
另自爲卷於後

中風門

侯氏黑散

金匱

治大風四肢煩重心中惡寒不足

菊花

三兩

白朮

一兩

防風

八錢

桔梗

六錢

黃芩

四錢

人參

茯苓

細辛

當歸

乾薑

芎藭

桂枝

牡蠣

蒸

礬石

各二錢

右十四味。杵爲散。酒服方寸匕。日三服。初服二十

日。用溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十

日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷服自

能助藥力。

外臺借此治風癰疾。

大風四肢煩重。脾土受風木之制。土氣內結。不能
敷布於四末也。心下惡寒不足者。胸中爲濁氣填
塞。心火內蘊。不得發越。熱極反兼寒化也。方中用
菊花四十分爲君。以解心下之蘊熱。防桂辛枯以
升發腠理。參苓白朮以實脾杜風。芍歸以潤燥熄
火。牡蠣礬石以固瀉腸胃。使參朮之性。留積不散。
助其久功。乾薑黃芩一寒一熱。寒爲風之嚮導。熱
爲火之反間也。用溫酒服者。令藥性走表以開其
痺也。冷食而禁諸熱物者。恐熱得熱而下不能盡。

其藥力以礬石性得冷即止得熱則下也。郭壅曰。黑散本為條除風熱。方中反用牡蠣礬石止瀉之味。且令冷食。使藥積腹中。然後熱食。則風熱痰垢與藥漸次而下也。

風引湯

金匱千金名紫石散

除熱癰疽并治大人風引小

兒驚癰癰日數十發

大黃

乾薑

龍骨

熬各一兩二錢

甘草

牡蠣

熬各六錢

滑石

石膏

各一兩八錢

赤石脂

紫石英

白石脂

寒水石

凡無石鹽代之

桂枝

各一兩子金作佳心

右十二味

杵篩

以葦囊盛之

取三指撮

井花水

三

升

煮三沸

溫服一升

巢氏借治肺氣郭重借治火逆

風者外司厥陰

內應肝木

上隸手經

下隸足經

中

見少陽相火

所以風自內發者

由火熱而生也

風

生必害中土

土病則四末不用

聚液成痰

癰者風

木挾痰

注於四肢也

癰者風

熱擾其經脈

內應於

心主也

前方祛風外散

此方引風內泄

故用大黃

兼甘草桂枝滑石石膏以化風熱

乾薑以爲反謀

使火無格拒之虞。石英寒水以潤血燥。石脂龍骨
牡蠣以補塞其空。絕風火復來之路也。

千金三黃湯

金匱

治中風。手足拘急。百節疼痛。煩

熱。心亂惡寒。經日不欲飲食。

麻黃

黃芩

各三錢
八分

獨活 三錢

細辛

一錢
五分

黃耆

六錢

右五味水煎溫服。一服小汗。二服大汗。心熱加大

黃錢半。腹滿加枳實一枚。氣逆加人參二錢。悸加

牡蠣二錢。渴加栝蒌根二錢。先有寒加附子一片。

石頑曰此方千金云仲景三黃湯治惡寒經日不足不欲飲食全似內外虛寒之候而方中反用黃芩之苦寒豈不礙麻黃輩之溫散乎既用麻黃復用黃芩豈不礙表氣之閉拒乎曷知惡寒經日不食雖有似乎虛寒而實衛虛不能勝邪所致不欲飲食亦是風熱內蘊之故觀煩熱心亂一語病情灼然故方中雖以麻黃獨活細辛開發腠理於外卽以黃芩清解風熱於內更慮衛虛難於作汗乃以大劑黃芩助之與黃芩建中之義不殊其用黃

蓄之意有二。一以佐麻黃開發之權。一以杜虛風復入之路也。方後復云。心熱加大黃。言服前藥後。心中煩熱不除。知黃芩不能祛之外散。卽以本方加大黃以引之下泄也。其加枳實。加人參。加牡蠣。加枯薑等法。或治壯氣。或助本元。各隨標本而施。加附子者。專佐麻黃之蒸發。助黃蓄溫經。殊非陰寒之謂。與麻黃附子細辛湯同源異派。○詳金匱以千金二字名方。珍重之也。千金祖金匱之意。而銜其集曰。備急千金方。不忘祖述之本也。

竹瀝飲子

千金

治風癱身無痛四肢不收志亂不

甚者用此方當先以竹瀝

十分生葛汁十分薑汁

一分和服然後用竹瀝飲子

芎藭

防己

附子

人參

芍藥

黃芩

甘草

桂心

羚羊角

石膏

杏仁

麻黃

防風

右十三味水煮減半內竹瀝十分生葛汁五分薑

汁半分分三服取汗。間二三日更服一劑。三服後隨病進退增減。

地黃飲子 治腎氣不上交於心舌瘡足癰。

熟地黃

三兩

巴戟天

酒浸去骨

肉蓯蓉

酒浸去脂切焙

山茱萸

去核

石斛

附子

炮

白茯苓

石菖蒲

遠志

甘草湯洗去骨

甜肉桂

麥門冬

去心各二兩

五味子

五錢

共為麤末。每服五錢。生薑五片。大棗一枚。薄荷七葉。水煎。日二服。服無時。

喻嘉言曰方中桂附已戟原為驅逐濁陰痰涎而設不可執已見而輕去之

天麻丸 治腎藏虛熱生風

天麻

牛膝二味酒浸二日焙 川萆薢

黑參

羌活各四兩 杜仲酒炒七兩

附子

炮去皮一枚 當歸十兩 生地黃酒浸焙六兩

為末煉白蜜丸侵晨沸湯臨卧溫酒送七十九

方中雖以歸地補養陰血為君其妙用全在天麻

與牛膝同浸同焙俾風痰濁溼咸從下趨而不致

上逆得力又在附子之雄引領歸地直入下焦填
補其空使風邪無復人之慮。薤白杜仲以祛在裏
溼熱羌活黑參以疎在表風熱標本合治有法歟
散各得其宜此方具矣

牛黃清心圓

局方裁定

治初中痰涎壅盛昏憤不省語

言寒瀆癰癰不遂一切痰氣閉塞證

牛黃

羚羊角

勿經火
鎔為末

茯苓

白朮

生用

杜心

當歸

甘草

各三錢

麝香

雄黃

錄水飛
各二錢

龍腦 錢半

人參

犀角 各五錢

右十二味各取淨末配勻蜜和成劑分作五十丸

金箔爲衣待乾蠟護隔用開化沸湯薑湯任下方原

尚有防風黃芩麥門冬白芍柴胡桔梗杏仁芎藭
阿膠大豆黃卷蒲黃神麴白薇乾薑薯蕷大棗一
十六味因太
冗雜故去之

清心牛黃圓 治暴中神昏不語痰塞心包口角流

涎煩熱氣急一切痰熱閉遏證

西牛黃 三錢

陳膽南星 一兩

黃連 薑汁浸炒五錢

當歸

甘草 炙各三錢五分

辰砂 五錢
水飛

爲極細末蒸餅和勻分作五十丸金箔爲衣候乾蠟護臨服剖開生薑湯薄荷湯入參湯量虛實選

用調化服

至寶丹

方

治諸中卒倒痰飲血氣俱閉寒熱交

錯者

生烏犀角

鎊

硃砂

研水飛

雄黃

研水飛

生玳瑁

鎊

琥珀

勿見火研各一兩

麝香

研

龍腦

研各一錢

金銀箔

各五片

西牛黃

研半兩

安息香

以無灰酒飛過濾去沙土約取淨一兩微火熬成膏如無以蘇合香油代之

右將犀玳爲細末入餘藥研勻將安息膏重用湯
煮後入諸藥和搜成劑分作百丸蠟護隔服劑用
參湯調化二丸卒中嵐障氣及產後惡血攻心
童便入薑汁化服

蘇合香圓

局方
藏定

治傳屍殭殍心腹卒痛僵仆不省

一切氣閉屬寒證

蘇合香

另研白
色者佳

安息香

無灰酒熬飛去
砂土各二兩

薰陸香

另研

龍腦

另研

丁香

麝香

另研勿經
火各一兩

青木香

白朮

沉香

另研極細

香附

炒

烏犀角

研極細

右十一味爲末逐一配勻諒加煉白蜜和劑分作

五十丸另以硃砂一兩水飛爲衣蠟護臨用剖開

并花水生薑湯溫酒化下一丸原方尚有白檀香

因太瀟燥故去之蘇合香圓取諸香以開寒閉

僅用犀角爲寒因寒用之嚮導與至寶丹中用並無異

李士材曰牛黃圓蘇合香圓皆中風門中奪門之

將而功用迥異熱阻關竅用牛黃圓開之寒阻關

竅用蘇合香圓開之若夫口閉手撒眼合聲鼾自

汗遺尿等虛脫證急用參附峻補庶或可救若用牛黃蘇合之藥入口卽斃也

稀涎散

治中風卒倒痰涎擁盛者脈氣虛微禁用

豬牙皂角

四條去皮弦子酥炙另爲末

白礬

一兩半生半枯爲末

每用三字溫水灌下未甦少頃再用○一方用巴

豆六粒去皮膜研壓去油入礬中鎔化待礬枯爲

末和牙皂末拌勻每用四五分吹入鼻中卽吐

濁氣風湧而上則清陽失位倒置故令暴仆以此

先治其標使咽喉疎通能進湯藥便止若欲攻盡

其痰則液無以養筋。令人攣急筋枯。此爲大戒。
舒筋三聖散 治口眼喎斜。左急右緩。血脈受邪者。

當歸

肉桂

延胡索

等分

爲散。每服五錢。水煎去滓。早暮各一服。

參歸三聖散 治風中血脈。左半肢廢。口目左喎。

舒筋三聖散去延胡索。加人參。

風中血脈。急需流布營氣。營行脈中。便不當泛用
風藥。所謂血行風自滅也。至於左半肢廢。氣血不
能運行。延胡耗血。胡敢輕試。必藉人參引領當歸。

肉桂何慮虛風之不散乎。

正舌散

治驚痰堵塞喉隧肝熱生風舌強不正。

蠍尾

去毒滾醋
泡炒三錢

茯苓

一兩薑
汁拌曬

為散每服二錢溫酒調服并擦牙齦日三度○面

赤倍蠍尾加薄荷半兩每服四錢水煎熱服取汗

効

解語湯

治中風脾緩舌強不語半身不遂。

防風

天麻

煨切齒
并焙

附子

炮各一
錢五分

棗仁

炒研二
錢五分

羚羊角

镑

觀桂

羌活

各八分

甘草

炙五分

水煎入竹瀝半杯薑汁數匕服無時脈虛加人參。

祛風定志湯 治心虛驚悸不能言

防風

棗仁

炒研

人參

當歸

各一錢

遠志肉

一錢二分

橘紅

菖蒲

南星

泡

茯苓

各八分

羌活

甘草

炙各五分

生薑

五片

水煎服無時

甄權防風湯

千金

治偏風

防風

羌活

白芷

牛膝

狗脊

薏苡

白朮各三錢

羌活

葛根

附子

外臺作人參

杏仁

各六錢

薏苡仁

石膏

桂心

各九錢

麻黃

一兩二錢

生薑

兩半

右十六味水煎分三服并鍼風池肩髃曲池支溝
五樞陽陵泉巨虛下廉各一凡七穴一劑覺好更
進一劑即鍼一度九劑九鍼即瘳矣亦得

薏苡仁湯

治中風溼痺關節煩疼不利

薏苡仁

一兩薤白

芍藥

酒洗

當歸

各錢半

麻黃

去節

桂各八分

蒼木

去皮芝麻并炒一錢

甘草

炙七

生薑

七片

水煎服無時

若白汗加石膏煩熱疼痛加酒黃藥厥冷拘急加

熟附子

升麻胃風湯

治胃風能食手足麻臂日瞶而噎

升麻

當歸

白芷

葛根 各六分

蒼朮 製八分

麻黃 去節

葉本

羌活

草豆蔻 研

蔓荊 子別各四分

柴胡

黃藥 薑製各三分

甘草 炙五分

生薑 三片

大棗 一枚

水煎食遠服

按風入胃府大便清血四射川人參胃風湯之桂
芍祛之內散風入胃經面目瞤動而腫者用升麻
胃風湯之升葛麻黃輩祛之外散不可不辨
犀角升麻湯 治風熱頭面腫痛頰上加糊咽喉不

利

犀角 鎊三錢

升麻 一錢五分

防風

羌活 各一錢二分

白芷

黃芩

白附子 各六分

甘草 炙四分

水煎食遠服

烏藥順氣散 局方

治暴中風氣攻注遍身麻痺語

言蹇澁口眼喎斜喉中氣塞有痰聲者

麻黃 去根節泡

橘皮

烏藥 各三兩

枳殼 炒

川芎

枳殼

甘草 炙

白芷

桔梗 各一兩

乾薑 炮 五錢

右十味為散每服半兩加生薑三片大棗一枚水煎熱服

吳鶴臯曰此治標之劑初病邪氣實者宜之

解風散 治風成為寒熱頭目昏眩支體疼痛手足

麻痺上膈壅滯

人參 二兩

麻黃 去節 一兩

芍藥

獨活

細辛

甘草 炙 各一兩

爲散每服四五錢入生薑五片薄荷七葉水煎服
按此本千金三黃湯去蒼朮加參芎甘草彼主杜
風清熱此主解散虛風同源異派。今人但知人
參爲補虛之藥不知人參有祛邪蕩實之功此證
因虛風久襲若獨用麻黃無人參助其胃氣必不
能克効也

古今錄驗續命湯

方祖

近効白朮附子湯

虎附

千金八風續命湯

麻黃

千金獨活湯

桂枝

三生飲

省風

四物湯

方祖

四君子湯

方和

二陳湯

方和

小續命湯

結命湯下

三化湯

方和

六君子湯

四君子湯下

大秦芩湯

四物湯下

十全大補湯

保元湯下

大建中湯

保元湯下

人參養營湯

保元湯下

大省風湯

生香湯下

八味順氣散

四君子湯下

千金附子散

麻黃湯下

省風湯

生香湯下

秦艽升麻湯

升麻湯下

滌痰湯

二陳湯下

涼膈散

方和

生香湯

方祖

導痰湯

二陳湯下

黑錫丹 全液 月 下

補中益氣湯 保元 湯 下

麻黃附子湯 麻黃 湯 下

含公當歸湯 保元 湯 下

胃苓湯 平胃 散 下

千金排風散 續命 湯 下

黃耆建中湯 桂枝 湯 下

小柴胡湯 方 煎

當歸補血湯 保元 湯 下

傷寒門

香蘇散 方 治感冒四時不正之氣

香附 薑汁 浸 勿炒 紫蘇莖葉 各二兩 橘皮 兩

甘草 炙 五錢

爲散每服半兩加生薑三片大棗一枚水煎去滓
熱服腰覆取微汗日三夜一服以得汗身涼爲度
芎蘇散 治三時感冒偏於血分者

半夏

茯苓

橘皮

葛根

柴胡

紫蘇

川芎

枳殼

桔梗 等分

甘草

炙減半

爲散每服半兩加薑棗煎服取微汗効

本方去川芎柴胡加人參前胡木香各參蘇飲治

虛人感冒偏於氣分者。

十神湯 局方

治感冒頭痛

麻黃

去節 泡

葛根

紫蘇

香附

橘皮

芍藥

川芎

各一錢

白芷

升麻

甘草

炙各五分

生薑

五片

葱白

四莖

水煎去滓熱服取微汗。

大陷胸丸

玉函

治結胸項強如柔痺狀下之則和。

大黃

八兩

葶藶

半升

芒硝

半斤

杏仁

生升去
皮尖熬

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取

如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二

升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取

下為効一如藥法

大陷胸湯

玉函

治結胸熱實脈沉而緊心下痛按

之石鞭

大黃

二兩

芒硝

二合

甘遂

一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝

煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

小陷胸湯

玉函

治小結胸正在心下按之則痛脈

浮滑者

黃連

三錢

半夏

三合

栝蒌實

一枚

右三味以水六升先煮栝蒌取三升去滓內諸藥

煮取二升去滓分溫三服

葱白香鼓湯

千金

治時疫傷寒三日已內頭痛如

破及溫病初起煩熱

葱白

連翹

香鼓

三合

右二味水煎。入童子小便一合。日三服。秋冬加生薑二兩。

按本方藥味雖輕。功效最著。凡虛人風熱。伏氣發溫。及產後感冒。靡不隨手獲效。與產後痢後。川伏龍肝湯丸不殊。既可探決死生。且免招尤取謗。真危證解圍之良劑也。

加減葱白香豉湯 治三時風熱。欬嗽。咽喉腫痛。難用葳蕤湯者。用此代之。

此卽葱白香豉湯。葱白減半。加葳蕤二錢。白薇青

木香桔梗各一錢。甘草薄荷各三分。白蜜三七

姜糖湯 千金 治風溫自汗身重及冬溫發熱咳嗽

姜糖 錢半

石膏 二錢

白薇

青木香

麻黃 去節

杏仁 去皮

甘草 炙

獨活

芎藭 各一錢

右九味水煎日三服 一方有葛根一錢

按千金姜糖湯乃長沙麻黃升麻湯之變方為冬

溫欬嗽咽乾痰結發熱自利之專藥以冬時有非

節之暖則陽氣不藏少陰受病故首推姜糖之潤

燥止欬爲君佐以白薇青木香苦鹹降泄卽春時
伏氣發溫更感於風之證亦不出此以葳蕤爲少
陰厥陰二經之嚮導也麻黃爲發汗之重藥得石
膏則有分解寒熱互結之功倘病勢較輕不妨於
中裁去麻黃石膏獨活芎藭杏仁等味合以葱白
香豉之類未爲不可如果熱勢紛糾急須開泄者
麻黃石膏又所必需在用方者臨病之權衡耳

犀角地黃湯

千金

治傷寒溫病一應發汗而不得

汗內蓄血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便血面

黃或中脘作痛

犀角

生地黃

酒浸另搗

牡丹皮

白芍

等分

右四味水煎去滓入地黃再煎數沸濾清服喜忘如狂加大黃黃芩脈大來遲腹不滿而自言滿者加當歸肉桂吐衄加藕汁扁柏童便

豬膚湯

玉函

治少陰經伏熱咽痛

豬膚

五兩湯泡刮下者

水煎濾去滓加白蜜白粉熬香和相得溫分六服

黃連阿膠湯 玉函

治熱傷陰血便紅

黃連

二錢五分

黃芩

一錢

芍藥

二錢

阿膠

三錢

雞子黃

一枚

右三味水煎去滓入阿膠烱盡小冷入雞子黃攪

勻服

葛根黃芩黃連湯

玉函

治誤下痢不止脈促喘而

汗出

葛根

半兩

黃芩

二錢

黃連

三錢

甘草

炙二錢

右四味先煮葛根次內諸藥去滓分溫再服。

人中黃散 治疔瘡溫

人中黃

一兩

雄黃

辰砂

各一錢

爲散每服二錢薄荷桔梗湯下日三夜二服

導赤瀉心湯 治熱傳手少陰神昏

黃連

酒洗

黃芩

酒洗

山梔

薑製炒黑

滑石

碎

知母

犀角

甘草

生

人參

麥門冬

去心

茯神

各一錢

生薑

切片

大棗

三枚

燈心一屏

水煎熱服

此湯專治傷寒熱傳手少陰心經之證。蓋取金匱
瀉心湯爲主。以其熱在上而不在下。病在氣而不
在血。故於本方裁去大黃。易入山梔以清包絡之
熱。知母犀角以解肺胃之煩。人參麥冬甘草茯神
以安君主之神。滑石爲導赤之嚮導。薑棗爲散火
之間使。用犀角者。卽導赤散中之地黃。用滑石者。
卽導赤散中之木通。雖無導赤散中藥味而導赤

散之功效備其中矣。嘗見時師畏人參助火除去不用。此與驅饑疲而禦大敵何異哉。

桂枝湯

方祖

麻黃湯

方祖

大青龍湯

麻黃湯下

五苓散

方祖

桃核承氣湯

承氣湯下

黃龍湯

承氣湯下

承氣湯

方祖

小柴胡湯

方祖

藿香正氣散

平胃散下

瀉心湯

方祖

大黃黃連瀉心湯

三黃湯下

附子瀉心湯

三黃湯下

梔子豉湯

方祖

枳實梔子豉湯

梔子豉湯下

四逆湯

方祖

當歸四逆湯

桂枝湯下

白通湯

四逆湯下

通脈四逆湯

四逆湯下

黃薷建中湯

桂枝湯下

枳實建中湯

理中湯下

越脾湯

麻黃湯下

桂枝二越脾一湯

桂枝湯下

黃芩湯

桂枝湯下

白虎湯

方祖

涼膈散

方祖

雙解散

涼膈散下

黃連解毒湯

三黃湯下

三黃石膏湯

三黃湯下

三黃梔子豉湯

三黃湯下

清熱解毒湯

白虎湯下

人中黃丸

三黃湯下

生料六味丸

八味丸下

四逆加人參湯四逆湯下

保元湯方祖

異功散四君子湯下

乾薑人參半夏丸理中湯下

附子理中湯理中湯下

附子湯木附湯下

回陽返本湯四逆湯下

生地黄黃連湯四物湯下

生脈散方祖

暑門

一物瓜蒂湯金匱

治夏暑以水灌汗身熱疼痛

瓜蒂十四箇
熬剉

右一味水煎去滓頓服少頃卽吐不吐擇之

此方之妙全在探吐以發越鬱遏之陽氣則周身汗出表和而在內之煩熱得苦寒湧泄亦湧條黑餘今人目睹其方而不知用醫道之陋若此消暑十全散 治傷暑兼感風邪發熱頭痛。

香薷 二錢

藟豆 炒搗

厚朴 薑製

陳皮

甘草 炙

白朮

茯苓

木瓜

藿香

蘇葉

各一錢

水煎熱服無時取微汗効

香薷飲

局方

治傷暑腹中不和煩渴引飲

香薷

二錢

厚朴

魯製一錢

藟豆

炒研一錢五分

甘草

炙一錢

水煎井中沉冷服之身熱欲得汗者熱服

黃連香薷飲

治人

治傷暑大熱煩渴

香薷

二錢

黃連

酒炒半錢

厚朴

薑製一錢

水煎熱服

導赤散

局方

治小腸實熱小便赤澀

生地黃

五錢

木通

甘草稍

生各一錢

竹葉

一握

右四味水煎熱服。溺血加辰砂五分。

一方多燈草一方多車前

十味香薷飲

治傷暑體倦神昏頭重吐利

香薷

二錢

人參

黃耆

酒洗

白朮

茯苓

甘草

炙

藊豆

陳皮

醋炒

厚朴

薑製

木瓜

各一錢

水煎欲作汗熱服欲利小便冷服

六和湯

治傷暑霍亂煩悶喘嘔吐瀉

香薷 二錢

人參

茯苓

甘草 炙

稿豆

厚朴 薑製

木瓜

杏仁 泡去
皮尖

半夏 醋炒各
一錢

藿香

砂仁 炒研各
六分

生薑 三片

大棗 一枚

水煎熱服

清暑益氣湯 保元
湯下

白虎加人參湯 白虎
湯下

五苓散 方祖

梔子鼓湯 方祖

益元散 方祖

白虎湯 方祖

竹葉石膏湯

白虎湯下

消暑丸

三陳湯下

藿香正氣散

平胃散下

養胃湯

平胃散下

木順散

理中湯下

冷香飲子

四逆湯下

梨水散

四逆湯下

來復丹

金液丹下

清燥湯

保元湯下

補中益氣湯

保元湯下

蒼朮白虎湯

白虎湯下

生脈散

方祖

小半夏茯苓湯

二陳湯下

生料六味丸

八味丸下

桂苓丸

五苓散下

參苓白朮散

四君子湯下

錢氏白朮散

四君子湯下

黃連解毒湯

三黃湯下

保元湯 方祖

澤門

羌活勝溼湯 治風溼上衝頭痛項似拔腰似折

羌活

獨活

防風

川芎

桑木

蔓荊子

碎

甘草

炙各一錢

生薑

三片

水煎熱服緩取微似汗過汗則風去溼不去也如無頭痛去蔓荊子換蒼朮

除風溼羌活湯

治風溼相搏一身盡痛日晡發熱

羌活

防風

柴胡

藁本

蒼朮

油製各一錢

升麻八分

生薑一片

水煎空心熱服覆暖取微汗

按羌活勝溼湯與除風溼羌活湯同源異派此治頭項之溼故用羌防芎藭一派風藥以祛上盛之邪然熱雖上浮溼本下著所以復用獨活透達少陰之經其妙用尤在緩取微似之汗故劑中加用甘草以緩諸藥辛散之性則溼著之邪亦得從之

緩去。無藉大開汗引。急驅風邪之法。使肌腠餒弱。無力。濕邪因之內縮。但風去而溼不去也。其有腰以下重。寒溼之邪。畱於陰分也。本方加防己以逐溼。必兼生附以行經。或見身重腰沉沉然。溼熱之邪過於陽分也。本方加蒼朮以燥溼。必兼黃芩以清熱。非同達長沙朮附桂附施子榮皮等方。不能效。用其法。其除風溼羌活湯。治外淫之溼。而無上衝頭項之痛。則用芎藭荆無預也。亦無溼著腰疼之患。與獨活无無交涉。故但用羌防藜蘆益人升。

柴蒼朮。開提周身關節。則溼邪自無所容而外散矣。

神木湯局方 治風木之邪。內于溼土。泄利下血。

蒼朮酒浸麻油并炒 藥本 川芎

羌活錢各一 白芷 甘草炙

細辛各五分 生薑三片 葱白一莖連須

右九味水煎熱服。

按神木湯純用風藥與羌活勝溼相去不遠。如何可治泄利下血。蓋火滯陽明之血則燥。金受傷祇。

合清涼。最嫌風燥。若風乘太陰之血。則溼土被鬱。
法當升散。切戒寒涼。當知陽明來者。色必鮮明。太
陰來者。色必清稀。其源各異。故其治亦迥乎不作。
究其旨。不越風能勝溼之義。蒼朮專主木邪乘土。
故能治脾內諸邪。以風水之邪。內干土藏。故用羌活。
芷辛等風藥。兼川芎以引入血分。甘草以調和胃
氣。胃氣敷布有權。泄利下血自止。蓋汗卽血之液。
奪其汗。則血中之溼熱邪氣悉從外泄。而無內滯
之患矣。

升陽除溼防風湯即升陽防風湯治風溼飧泄及腸風滯

下便血

防風二錢

蒼朮泔浸去皮白朮土蒸

茯苓

白芍各一錢生薑一片

水煎熱服取微汗

陽陷於下則成飧泄溼犯於上則令頭痛清濁倒置而然故用風藥以勝溼也然風木之病稍加桂枝甘草監製其功尤捷

茵陳蒿湯玉函

治溼熱發黃便秘脈實

茵陳蒿 五錢

梔子 五枚

大黃 二錢

右三味水煎熱服微利黃木去爲度米去越三日再服。

按茵陳蒿湯其旨全在通利水道不得不借幽門爲嚮導爾。

清熱滲濕湯 治夏月濕熱痠風煩渴泄瀉溺赤。

黃蘗 鹽酒炒

蒼朮 去皮同

白朮 生

茯苓

澤瀉

黃連 酒炒各

甘草 炙五分

竹葉 十片

水煎熟服小便利爲効

老人虛人加肉桂少許氣虛喘乏加人參服虛合生脈散內傷生冷加炮薑

按此本二妙合五苓之半加黃連甘草以燥夏令之溼熱良可法也

當歸拈痛湯 治溼熱走注遍身骨節煩疼胸膈不利足脛赤腫重痛

羌活

甘草 炙

黃芩

茵陳

酒炒各一錢

人參

苦參

酒洗

升麻

多汗易黃蘗

葛根

蒼朮

消浸自汗易桂枝

歸身

各六分

白朮

薑製

防風

下腫易防已

知母

疼熱易黃蘗

猪苓

澤瀉

各八分

生薑

一片

水煎熱服無時

此瀝熱疼腫之聖方。若不赤不腫痛。上不熱。為寒

證。禁用。

滲瀝湯

理中湯加蒼朮黃蘗桂枝

五苓散

方祖

除瀝湯

平胃散加蒼朮黃蘗

腎著湯

理中湯加茯苓

黃耆建中湯

桂枝加黃耆湯

小建中湯

桂枝倍芍藥加膠饴湯下

苓桂朮甘湯

桂枝湯下

小青龍湯

桂枝去芍藥加麻黃半湯下夏乾姜細辛五味子

麻黃加朮湯

麻黃湯下

麻黃杏仁薏苡甘草湯

麻黃

湯下

敗毒散

小柴胡去半夏加蒼朮湯下加桑葉花柳等藥

五積散

平胃加麻桂炮姜蒼朮枳實散下婦科等症生薑葱白

防己黃耆湯

方祖

桂枝附子湯

朮附湯下

白朮附子湯

朮附湯下

甘草附子湯

朮附湯下

桂枝湯

方祖

桂苓甘露飲

五苓散下

虎潛丸

大補丸下

神芎丸

三黃湯下

瀉心湯

方祖

六君子湯

四君子湯下

清燥湯

保元湯下

春澤湯

五苓散下

控涎丹

十棗湯下

地黃飲子

中風門

黑錫丹

金液丹下

生脈散

方祖

濟生腎氣丸

八味丸下

燥門

五味子湯

千金

治傷燥欬唾中有血牽引胸脇痛。

皮膚乾枯

五味子

五分炒研

桔梗

甘草

紫苑茸

續斷

竹茹

桑根皮

蜜炒各一錢

生地黃

二錢

赤小豆

一微即亦豆之

者

右九味。水煎空心服。秘旨加白蜜一匙。

麥門冬湯

十金

治大病後火熱乘肺。欬唾有血。胸

膈脹滿。上氣羸瘦。五心煩熱。渴而便秘。

麥門冬

去心二錢

桔梗

桑根皮

蜜炙

半夏

生地黃

紫苑茸

竹茹

各一錢

麻黃

七分

甘草

炙九分

五味子

十粒碎

生薑

一片

右十一味。水煎空服。

石頑曰。按千金麥門冬湯。卽五味子湯中。去續斷赤小豆。加門冬麻黃半夏生薑。而五味子湯專治燥欬。方中反用續斷以燥溼。麥門冬湯專治火熱乘肺。欬唾有血。反用麻黃半夏。世都莫解其故。是以并其方面置之。不知致燥之由。皆緣經脈阻滯。非續斷不能通之。欬唾有血。是傷寒大病後餘邪蘊釀爲火。而乘於肺。非麻黃不能開之。痰凝氣結。津液不行。非半夏不能祛之。與活人知母麻黃湯。

和劑欬冬花散等。立法不殊。今人每謂半夏性燥。一切渴家亡血家禁用。又謂半夏辛溫。不當與門冬竹茹寒潤藥同用。若爾則金匱麥門冬湯竹葉石膏湯俱不足法耶。

地黃煎

千金

治風熱心煩。欬喘便秘。脾胃熱壅食不下。

生地黃汁

枸杞子汁

二味酒搗各取汁

荆瀝

竹瀝

各半升

真酥

生薑汁

各一合

人參

天門冬

去心各一兩

白茯苓

八錢

大黃

酒蒸

梔子

薑汁炒黑
各五錢

右十一味。以後五味爲細末。入前六汁內。調服方寸匕。再服漸加。以利爲度。

生地黃煎

千金

治積熱煩渴。日晡轉劇。喘欬面赤。

能食便秘。

葳蕤

知母

茯神

栝蒌根

鮮地骨皮

各二兩

石膏

四兩碎

生地黃汁

二升

麥門冬汁

各一合

生薑汁

二合

竹瀝

六合

右咬咀以水一斗二升。先煮諸藥取汁三升。去滓下竹瀝地黃門冬汁。緩火煎至四升。下煉白蜜。薑汁再煎數沸。初服三合。日三夜一服。加至四合。夏月爲散。收薑汁竹瀝焙乾。蜜丸服。煎膏尤妙。喻嘉言曰。此方生液涼血。製火撤熱。兼擅其長。再加人參。乃治虛熱之良劑。然非能食便秘者。斷不可施。

通幽湯 治大便燥結便出堅黑

油當歸二錢五分

升麻三分
醋浸

桃仁泥一錢

甘草

生多各五分

紅花

少許

熟地黃

生地黃

各一錢五分

水煎將成用藥汁磨檳榔五分調入稍熱服。

潤燥湯

通幽湯加麻仁大黃各一錢

清涼飲

治上焦積熱肺氣不化口舌乾燥。

黃連

黃芩

薄荷

黑參

當歸

赤芍藥

各一錢五分

甘草

炙一錢

水煎入生白蜜一匕熱服。大便秘結加酒蒸大黃

四順清涼飲

一名四順飲

治血熱便秘脈實者

當歸

赤芍

甘草

大黃

酒蒸各一錢五分

水煎入生白蜜一匕熱服。

按清涼飲治上焦之燥熱故用薄荷之辛散四順

飲主下焦之燥結故用大黃之苦寒功用天淵

麻仁丸

玉函

治脾約大便燥結

厚朴

薑汁炒

芍藥

枳實

炒各二錢

大黃 四錢

麻仁泥

杏仁 炮去皮尖
各錢半

右六味爲末。煉白蜜丸。梧子大。飲服五十丸。日三服。以利爲度。

潤腸丸 治大腸風熱血秘

麻仁

桃仁 另研各
一兩

羌活

當歸

各半兩

大黃

絲礬水浸淨
紙裏煨半兩

皂角仁

秦艽

各半兩
一作防風

除二仁另研外。爲細末。蜜丸。梧子大。每服五十丸。食前溫酒下。○本方加郁李仁。防風。名潤燥丸。

猪膽導玉函

大猪膽一枚。瀉汁和醋少許。以灌穀道中。如一
食頃。當大便出。虛人不可用。膽導。陳醬薑陳醬
瓜皆可削爲導。溼熱肥盛痰闕。可用黃瓜根浸
溼削之爲導。此卽土瓜根導也。

蜜煎導

白蜜七合。一味內銅器中。微火煎之。稍凝如飴
狀。攪之勿令焦著。欲可丸。并手捻作挺。令頭銳
大如指。長五寸。當熱時急作。冷則硬。納穀道中。

以手急抵。欲大便去之。

異功散

四君子湯下

六味丸

八味丸下

固本丸

二冬膏下

滋燥養營湯

四物湯下

大補地黄丸

四物湯下

虎潛丸

大補丸下

火門

紫雪散治脚氣瘴毒。內外熱熾。狂越躁亂。心腹疔痛。

口舌生瘡。一切實火閉結。諸藥不効者。

黃金

十兩黃金鋪中葉子有効

用水三斗。先煮一斗。旋添煮至一斗。為度。去金取

汁煮下項藥。

石膏

寒水石

如無真者元精石代之

磁石

醋煨

白滑石

各五兩

上四味搗入前汁中。煮至五升。入下項藥。

烏犀角

鎊

羚羊角

鎊

青木香

切

沉香

研各五錢

黑參

切

升麻

各一兩六錢

生甘草

八錢

丁香

楊碎一錢

上八味。入前汁中。煮取一升五合。去滓入下項藥

芒硝

一兩

焰硝

三兩

上二味入前藥汁中。微火上煎。柳木槌攪不住手。候有七合半。投在水盆中。半日欲凝。入下項藥。

硃砂

研細水飛淨五錢

麝香當門子

研一錢二分

上二味入前藥中攪勻。勿見火。寒之二日。候凝結成霜紫色。鉛罐收貯。每服一分至二分。杵細冷水或薄荷湯調下。小兒以意量減。

此卽千金玄霜局方於紫雪方中。參入甘草丁香。硃砂三味。遂用紫雪之名。一方而兼兩方之製。但此專主石藥毒火。方中丁香一味。用方者審之。

黃金本無氣味。必鋪中葉子。曾經煉煅者。之方有性味。以其香味易散。故較原方減小其製。

碧雪

局方

治一切積熱咽喉腫痛。口舌生瘡。心中煩躁。嚙物妨悶。或喉閉壅塞。水漿不下。天行時疫。發狂昏憤。並皆治之。

寒水石

芒硝

石膏

般飛

青黛

馬牙硝

朴硝

硝石

甘草

各等分

右將甘草煎湯二升去滓。却入諸藥。再煎用柳木

簞不住手攪令消鎔得所。却入青黛和勻。傾入砂盆內。候冷結凝成霜。研爲末。每用少許。含化嚥津。不拘時候。如喉閉壅塞。不能嚥物者。用小竹筒吹藥入喉中。頻用神効。

朴硝煎

千金

治服石藥成消痺大渴者

朴硝

一觔

芒硝

八兩

石膏

二兩

寒水石

四兩

右四味。先內二硝於八升湯中。攪令消。以紙密封。一宿。取清。內銅器中。別搗寒水石。石膏碎如豆粒。

以絹袋盛之納汁中以微火煎候其上有膜起以箸投中着箸如凌雪凝白急下瀉貯盆中待凝取出。出烈日曝乾積熱困悶不已者以方寸匕白蜜二合和冷水五合攪和令消頓服之旦二熱定即止。

武德中貴高
人加金二兩

八味丸 方祖

保元湯 方祖

解毒湯 三黃湯下

火鬱湯 升麻湯下

瀉陰火升陽湯 保元湯下

升陽散火湯 升麻湯下

佐金丸 方祖

當歸龍薈丸 三黃湯下

黑錫丹 丹金液下

四君子湯 方祖

六味丸 丸八味下

生脈散 方祖

滋腎丸 丸補陰下

傷飲食門

枳實導滯湯

治傷溼熱之物痞悶不安

枳實 炒三錢

白朮 炒焦五錢

茯苓 三錢

黃芩 酒炒二錢

黃連 黃汁炒三錢

澤瀉 炒三錢

大黃 酒蒸一兩

神麴 炒四錢

生薑 三片

水煎食遠服

此枳朮丸合三黃湯而兼五苓之製以祛溼熱宿滯也

木香化滯湯 治氣食痞結腹微痛不思飲食

半夏

甘草

草豆蔻

所各一錢

柴胡

木香

橘皮

各六分

枳實

炒

當歸

各四分

紅花

一分

生薑

五片

水煎食遠稍熱服

保和丸

治宿食酒積

山查肉

薑汁泡二兩

半夏

薑汁炒

橘紅

炒

神麴

炒便血用紅麴

麥蘖

炒去殼

茯苓

連翹

萊菔子

黃連

薑汁炒各五錢

爲末。水泛爲丸。每服二錢。茶清送下。

本方加炒白朮二兩。名大安丸。

按保和丸。大安丸。中麥蘖傷腎。菔子傷脾胃之氣。恐非凡劑所宜。久服之品。當易極實。香附子功用不殊。而不致傷犯先後天之真氣也。

紅丸子

治宿食冷積作脹

荆三稜炒

蓬莪朮炭

青皮炒

陳皮炒

乾薑炮等分

爲末。陳酒麴糊丸。梧子大。礬紅爲衣。每服三五十丸。食前沸湯下。小兒量減。

葛花解酲湯 治傷酒嘔吐胸痞小便不利。

葛花

白豆蔻

砂仁炒各一錢

青皮炒

神麴炒

澤瀉

乾薑各五分

白朮炒八分

人參

橘紅

茯苓

猪苓各四分

木香 一分

水煎服。但得微汗。則酒溼去矣。

按此雖本五苓。即君子益入葛花豆蔻等辛散之。味大損元氣。世人不知。妄謂方中人參有補益之功。恃此縱飲。是自伐其天也。

麴蘖丸

治酒積成癖。腹脇滿痛。後便積沫。

神麴 炒

麥蘖

炒去殼 各一兩

黃連

半兩 同炒

去巴

爲末。水泛爲丸。梧子大。每服五十丸。食前薑湯下。

○酒積下白沫加炮薑二錢下鮮血倍黃連下瘀血加紅麴一兩

塌氣丸 治肝氣乘脾腹脹

胡椒 一兩

蠟尾 去毒滾醋泡去
鹽炒香半兩

為末麴糊丸粟米大每服二三十丸米飲下

神保丸 治心胸腹脇脹痛大便不通宿食不消

塌氣丸加水香二錢五分巴豆霜二分半本方

中胡椒用二錢五分蠟用全者七枚

為末湯浸蒸餅丸麻子大硃砂為衣每服五九空

心薑湯醋湯沙糖湯任下。

酒癰丸

局方

治酒癰腹痛下積遇酒卽吐。

崩氣丸去胡椒加雄黃油煎皂子大一枚巴豆十五粒不去油本方中蠟梢用十五枚不去毒爲末入白麴二兩半滴水丸如豌豆大候稍乾入麴炒香每服二三丸溫酒下茶清亦可。

平胃散

方劑

枳朮丸

方劑

補中益氣湯

保元湯下

二陳湯

方劑

芍蘇散

傷寒門

藿香正氣散

霍亂散下

承氣湯 方祖

備急丸 方祖

白散 備急丸下

六君子湯 四君子湯下

七味白朮散 四君子湯下

九味資生丸 四君子湯下

枳實理中湯 理中湯下

連理湯 理中湯下

八味順氣散 四君子湯下

五苓散 方祖

獨參湯 保元湯下

四君子湯 方祖

涼膈散 方祖

六味丸 八味丸下

傷勞倦門

殊砂安神丸 治熱傷心胞氣浮心亂虛煩不寧

硃砂

水飛五錢
一半為衣

甘草

五錢

黃連

酒蒸
六錢

當歸

二錢
五分

生地黄

一錢
五分

除硃砂共為細末。湯浸蒸餅為丸。黍米大。硃砂為衣。每服十五丸至三十丸。獨參湯或補中益氣湯送下。

凡言心經藥都屬心包。惟硃砂外稟離明。內含真汞。故能交合水火。直入心藏。但其性徐緩無迅掃陽焰之速効。是以更需黃連之苦寒。以直折其勢。甘草之甘緩。以款啟其微。俾關上之實火虛火悉

從小腸而降泄之允爲勞心傷神動作傷氣擾亂
虛陽之的方豈特治熱傷心包而已哉然其與
在當歸之辛溫走血地黃之濡潤滋陰以杜火氣
復熾之路其動靜之機多寡之制各有至理良工
調劑之苦心其可忽諸。

黃耆建中湯

桂枝湯下

補中益氣湯

保元湯下

小建中湯

桂枝湯下

理中湯

方祖

平胃散

方祖

五苓散

方祖

六君子湯

四君子湯下

枳朮丸

方祖

枳實理中湯

理中湯下

八味丸

方祖

當歸補血湯

保元湯下

調中益氣湯

保元湯下

升陽順氣湯

保元湯下

升陽補氣湯

升陽湯下

門冬清肺飲

滋陰散下

升陽益胃湯

保元湯下

犀角地黃湯

傷寒門其

保元湯

方祖

四君子湯

方祖

八珍湯

四君子湯下

十全大補湯

保元湯下

六味丸

八味丸下

虛損門

薯蕷丸

金匱

治虛勞諸不足風氣百疾

薯蕷

卽山藥
二兩

當歸

桂枝

麴

乾地黄

大豆黃卷

各七錢半

甘草

炙一兩
二錢

人參

阿膠

各五錢

芎藭

芍藥

麥門冬

白朮

杏仁

防風

柴胡

桔梗

茯苓

各四錢

乾薑

二錢

白欬

錢半

大棗

五十枚
爲膏

右二十一味末之。煉白蜜和丸。如彈子大。空心服。一丸。一百丸爲劑。

酸棗湯

金匱

治虛勞虛煩不得眠盜汗

酸棗仁

炒牛兩

甘草

炙一錢

茯苓

知母

炒

芍藥

各二錢

右五味水煎溫分二服○潑師加生薑便澹去知

母加人參服此盜汗不止去芍藥加芍藥恒仲去

知母芍藥加人參黃耆當歸陳皮蓮肉

大黃蠱蟲丸

金匱

治五勞虛極羸瘦腹滿不能飲

食內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑宜用此方攻其

惡血然後補之

大黃

二錢半

黃芩

二錢

甘草

三錢

桃仁

一合

杏仁

一合

乾地黄

一兩

芍藥

四錢

乾漆

散令州盡一錢

蟲蟲

一合

水蛭

十枚猪脂熬

蟬蛸

一合

廬蟲

半合

右十二味爲末蜜丸如小豆大溫酒服五十九日

三服

百勞丸

治一切勞瘵積滯疾不經藥壞者宜服

當歸

炒

乳香

沒藥

各一錢

人參

二錢

大黃

四錢

梔子

十四枚去皮熬

蟲蟲

十四枚

水蛭

十四枚 熬黑

爲末煉白蜜丸。梧子大。每服百丸。百勞水下。取下惡物爲度。服白粥十日。百勞水以杓揚之百遍。然後煮沸。卽甘瀾水法也。

瓊玉膏 治虛勞乾欬喉中血腥腸中隱痛。

鮮地黄

四十兩

人參

另爲末

白茯苓

另爲末 各十兩

沉香

另研

琥珀

另研各半兩

先以地黄熬膏。點紙上不滲。入人參茯苓末。并入糖。二十兩攪勻。溶化離火。再入琥珀沉香。和勻。

滋陰收藏。清晨午前溫酒服數匙。沸湯亦可。

四味鹿茸丸。治肝腎督脈皆虛。欬嗽吐血。脈虛無力。上熱下寒。

鹿茸

酥炙另
偽成泥

五味子

當歸身

各一
兩

熟地黃 二兩

爲細末。酒和丸。梧子大。每服四五十九。空腹溫酒送下。

濟生鹿茸丸

作湯各生
杜鹿茸丸

治腎藏真陽久虛。下體痿

弱。疼痛。喘嗽。水泛爲痰。

鹿茸酒炙

牛膝鹽酒炒

五味子各二兩

石斛

巴戟肉

附子炮

川棟肉酒蒸

山藥

肉桂

杜仲鹽酒炒

澤瀉鹽水炒

沉香另研五錢

為末酒糊丸梧子大每服七十九侵晨溫酒下俗

本尚多白棘兔絲慈石陽起石四味

安腎丸 治腎虛風襲下體痿弱疼痛不能起立

肉桂

川烏頭炮各五錢 白蘗炙去

巴戟天去骨

薯蕷薑汁炒

茯苓

石斛酒炒

川草薢炒

白朮

肉蓯蓉

酒浸去腐

補骨脂

炒各四兩八錢

爲末煉蜜丸梧子大每服七十九空腹鹽湯臨臥

溫酒下

腎藏爲風寒所襲所以不安故用烏頭蒺藜祛風散寒之劑風去則腎自安原無事於溫補也其他桂苓朮薢脂戟蕤解難曰兼理脾腎而實從事乎祛溼利水祇緣醉飽入房汗隨風發所以肢體沉重非藉踈通滿漚病必不除因彷彿地黃飲子而

爲製劑彼用地黃菖志冬味萸附以交心腎之氣
此用茯苓朮續骨脂烏頭以祛坎陷之風與崔氏
八味丸迥乎不同也

四烏鯁骨一蘆茹丸 素問

治氣竭肝傷脫血血枯

婦人血枯經閉丈夫陰痿精傷

烏鯁骨

四兩卽烏鯁骨

蘆茹

一兩本草作茹蘆卽茜根

丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯飲以鮑魚汁
利腸中及傷肝也

內經之方不多見僅僅數方世都棄置不請況甲

乙太素誤作蘭茹致王太僕亦作蘭茹性味訓解
所以目睹其方究竟不識爲何物爾嘗考本草二
味竝皆走血故內經以之治氣竭傷肝血枯經閉
等證九以雀卵飲以鮑魚汁者取異類有情以暖
腎調肝則虛中留結之乾血漸化黃水而下矣後
飯者先藥後飯使藥力下行也惟金水二藏陰虛
陽擾喘嗽失血強中滑精者藥用以其專主溫散
而無涵養真陰之澤也

或問烏鰂茹蘆俱蒐血之品如何可治血枯經閉

之疾。答曰：夫血枯經閉，非純虛而經絕不行也。良由氣竭，肝傷，乾血內結，以故營血不能內藏。如胸脇支滿，目眩，血結肝部也。聞腥臊妨於食，血結胃脘也。出清涕，胃氣衰而濁逆清道也。凡崩淋胞痺，諸證若沃以湯，上爲清涕，皆陽衰不能灌注精微，敗殘之液悉化爲涕，得湯氣蒸而上走空竅，也是知血枯經閉，必以清理乾血爲首務。故金匱治五勞虛極羸瘦，內有乾血，用大黃廔蟲丸。由此而推，胞痺精傷，亦必清理敗濁爲首務。蓋大黃廔蟲丸。

一泓破瘵之味較烏鰂慈茹丸之蒐血猛峻百倍耳

又問雀卵以時而生急需未可必得奈何荅曰大匠在乎繩墨不拘物料皆可成器雀卵功專煖腎如無雀肉煮搗可代雞卵及肝亦可代雞屬巽而肝主血也活法在人可執一哉

花藥石散

秘方

治氣虛血凝瘀積壅聚胸膈作痛

宜用重劑竭之

花藥石

五兩碎產硫黃山中狀如黃石中有黃點如花之心故名花藥近世皆以玢玢

如花藥者偽充欲試真偽服過置血上血卽化水者真

硫黃二兩

右二味同入煬成礮內鹽泥封固煅一伏時研如麩每用二錢食遠童便調服婦人產後血逆血暈胞衣不下或子死腹中俱宜服之瘀血化爲黃水然後以獨參湯調之

十灰散 治虛勞吐血咯血先用此遏之

大蓊

小蓊

栢葉

薄荷

茜根

茅根

山梔

大黃

牡丹皮

樓欄皮

等分

各燒灰存性紙裏蓋地上一夕食遠服二三錢童便調下

花藥石散爲破血之峻劑功專化血爲水而世畏其峻罕能用之葛可久言暴血成升斗者宜花藥石散若病久涉虛及肝腎二家之血非其所宜且與十灰散並舉而言不分寒熱主治所以後世不能無誤用之失當知十灰散專主火炎上湧之血倘誤用以治陰邪固結之證爲害猶輕若誤用花

藥石散治血熱妄行之病爲患莫測况血熱妄行
十常八九陰邪固結十無一二所以舉世醫者病
者俱畏之如蠟遂致置而不講乃致一切陰邪暴
湧之血悉皆委之莫救豈其命耶

瑞金丹 治虛勞吐血瘀結者

川大黃

酒拌炒黑至黃烟起爲度

真秋石

各一兩

右杵爲細末煮紅棗肉爲丸小豆大空腹薄荷湯
下二錢

瘀在心包不時驚悸面赤神昏者加真鬱金三錢

皮色如梧桐。于紋綳者真。瘀在胃吐血成盆者犀角地黃湯送下。

童真丸 治虛勞吐血氣虛喘嗽

真秋石 川貝母去心等分

右二味。炙紅棗肉為丸。空腹薄荷湯下二錢。

如脈虛氣耗。加人參。若脈細數為陰虛。禁用人參。加牡丹皮。脾虛溏泄。加山藥茯苓炙甘草。

龜鹿二仙膏 治督任俱虛精血不足

鹿角膠 一觔 龜版膠 半觔 枸杞 六兩

人參

四兩另為細末

桂圓肉

六兩

右五味以杞圓煎膏煉白蜜收。先將二膠酒浸。烱杞圓膏中候化盡。人參末磁罐收貯。清晨醇酒調服五六錢。

聚精丸

治腎虛封藏不固

鯢膠

白淨者一觔碎切。蛤粉或牡蠣粉炒成珠。再用乳酥拌炒。則不粘粉。

沙苑蒺藜

五兩乳浸一宿。隔湯蒸一炷香。晒乾勿炒。

為細末。煉白蜜中加入陳酒再沸。候蜜將冷。為丸。不可熱搗。熱搗則膠粘難丸。丸如菜豆大。空心溫

酒或白湯下八九十九忌諸魚牛肉

張景岳加五味二兩

大補黃庭丸 治虛勞食少便澹不宜陰藥者

人參 一兩

茯苓 一兩

山藥 二兩

右爲末用鮮紫河車一具用河水二升稍入白蜜隔水熬膏代蜜爲丸空心淡鹽湯下三錢

異順丸 治婦人倒經血溢於上男子咳嗽吐血左手關尺脈弦背上畏寒有瘀血者

烏骨白絲毛雞

一隻男雌女雄取嫩長者溺倒泡去毛竹刀剖脇出脆肝去穢

留內金并去腸
茹仍入腹內
烏鰂骨
童便浸晒乾為末
微炒黃取淨四兩

茹蕙
去稍酒洗切片
淨一兩即舊根
鮑魚
切薄片
四兩

右三味入雞腹內用陳酒童便各二碗水數碗砂

鍋中旋煮旋添糜爛汁盡擣爛焙乾骨用酥炙共

為細末乾山藥末調糊為丸梧子大每服五七十

丸空心百勞水下
百勞水見
百勞丸下

烏骨雞丸
秘旨
治婦人鬱結不舒
蒸熱咳嗽月事

不調或久閉不行或倒經血溢於上或產後傷勞

或崩淋不止及帶下赤白白淫諸證兼療男子斷

喪太早勞嗽吐紅成虛損者

烏骨白絲毛雞

一隻男雌女雄製法同異順丸

北五味

一兩碎

熟地黃

四兩如血熱加生地黃二兩

右二味入雞腹內用陳酒酒釀童便於砂鍋中煮

如異順丸

綿黃耆

去皮蜜酒拌炙

於木

飯上蒸九次各三兩

白茯苓

去皮

當歸身

酒洗

白芍藥

酒炒各二兩

右五味預爲粗末同雞肉搗爛焙乾骨用酥炙共

爲細末入下項藥

人參

三兩虛甚加至六兩

牡丹皮

二兩酒淨勿炒

川芎

一兩童便浸切晒

右三味各爲細末和前藥中另用乾山藥末六兩打糊衆手丸成曬乾勿令餽磁罐收貯侵晨人參湯或沸湯送下三錢卧時醇酒再服二錢大便實者煉白蜜爲丸亦可

骨蒸寒熱

加九肋鱉甲

三兩

銀柴胡

地骨皮各一

兩五錢

經閉加肉桂

一兩

崩漏下血

倍熟地加真

阿膠

二兩倒經血溢

加麥門冬

二兩

鬱結痞悶

加

童便製

香附

二兩

沉香

半兩

赤白帶下加真川草

薤二兩四製香附二兩蘄艾一兩白淫倍用參薤
苓木

按烏骨雞丸諸藥皆平常無奇而調經最驗蓋雞
屬巽補肝尤妙在烏骨益腎變巽歸坎甲癸同源
兼滋衝任也

孫真人云自古名賢治病多用生命以濟危急雖
曰貴人賤畜至於愛命人畜一也如白鳳膏烏骨
雞丸等方爲虛損門中調經要藥在證治之所必
需者不得已而用之以人命至重非蚬飛蠕動之

此苟有他方可以代充取効尤爲曲體天地好生之心倘用之無濟徒傷生命以爲財利之謀仁人君子諒不爲之也

逍遙散

局方

治肝氣抑鬱寒熱咳嗽月事不調

柴胡

七分

白朮

蜜水拌蒸一錢

茯苓

一錢

甘草

炙八分

常歸

一錢

白芍

酒炒五錢

陳皮

畧去白人分乾咳用蜜製

薄荷葉

五分

煨薑

三片

右九味水煎半饌時服

加味逍遙散

逍遙散加牡丹皮一錢五分炒黑山梔一錢

脾虛食少便溲去山梔易香附

此本八珍湯去參之益氣芎之上竄地之臙膈而加入柴胡陳皮薄荷以疎肝氣薑用煨者取其守中而不致於辛散僭上也加丹皮山梔者以清上下之火也

芎歸血餘散 治傳屍勞瘵面赤五心煩熱

室女頂門生髮

煨存性 開洗淨

芎藭 童便浸切五錢

當歸 三錢

木香

桃仁 二錢 去皮各

真安息香

如無蘇合香油代之

雄黃

各一錢

全蠍

三枚不去毒炒香

降真香

五分

獾肝

一具如無以江上大

鯉魚頭活截一枚代之酥炙

為散新汲水煎月初五更空腹服頭導日午服二

導

龍甲生犀散

治傳屍勞瘵脾虛唇面手足清

天靈蓋

一具酥炙男者色不赤黑可用女者有赤黑色勿用

鼈甲

九肋者一枚酥炙

虎長牙

一枚酥炙

安息香

桃仁去皮

尖欖櫚各半兩

生犀角銹

木香

甘遂

降真香

乾漆炒令烟盡

真阿魏酒研各三錢

雷丸二錢

穿山甲取四趾尾尖上者土炒三錢

全蠍三枚醋泡炒香

地龍七枚生研和藥

右為細末每服半兩先用香豉四十九粒連鬚葱白七莖石臼杵爛新汲水碗半童便半碗內藥末煎取七分入麝香一字月初五更空腹溫服少時必瀉出蟲以淨桶盛之鉗取付烈火焚之如瀉不

止煨龍骨炒黃連等分爲末沸湯下五錢次日用
白梅粥補之

傳屍丸 治傳屍勞瘵初起元氣未敗者

鰻鱺魚

半觔外
者七條

甌中先鋪薄荷葉四兩入鰻在內摻乾山藥粗末
勸餘鍋內入去心百部一觔煮三炷官香候鰻爛
極去薄荷取鰻與山藥連骨搗爛焙爲末煉白蜜
丸侵晨臨卧沸湯各服五錢

桂枝龍骨牡蠣湯

桂枝
湯下

小建中湯

桂枝
湯下

黃耆建中湯

桂枝湯下

八味腎氣丸

方祖師八味丸換桂枝

理中丸

方祖

固本丸

二冬膏下

集靈膏

二冬膏下

四物湯

方祖

犀角地黄湯

傷寒門

獨參湯

保元湯下

保元湯

方祖

聖愈湯

保元湯下

異功散

四君子湯下

六味丸

八味丸下

納氣丸

八味丸下

十補丸

八味丸下

香薷八味丸

八味丸下

枳實理中湯

理中湯下

甘草乾薑湯

理中湯下

炙甘草湯

桂枝湯下

白鳳丸

平胃散下

生脈散

方和

補中益氣湯

保元湯下

歸脾湯

保元湯下

增損柴胡湯

小柴胡湯下

滋腎丸

大補丸下

玉燭散

四物湯下

蘇合香丸

中風門

四君子湯

方和

六君子湯

四君子湯下

桂枝人參湯

理中湯下

當歸補血湯

保元湯下

澤木麋銜湯

五苓散下

潮熱門

涼膈散

方和

大柴胡湯

小柴胡湯下

逍遙散

虛損門

小柴胡湯

方祖

加味逍遙散

虛損門

六味丸

凡味丸下

當歸補血湯

保元湯下

加減八味丸

凡味丸下

惡寒門

大承氣湯

小承氣湯下

指迷茯苓丸

二陳湯下

理中丸

方祖

升陽益胃湯

保元湯下

補中益氣湯

保元湯下

枳實理中湯

理中湯下

二陳湯

方祖

火鬱湯

升麻湯下

升陽散火湯

升麻湯下

大建中湯

保元湯下

金花湯

三黃湯下

六味丸

八味丸下

生脈散

方祖

異功散

四君子湯下

附子湯

木附湯下

八味丸

方祖

人參白虎湯

白虎湯下

清暑益氣湯

保元湯下

苓桂朮甘湯

桂枝湯下

桃核承氣湯

小承氣湯下

犀角地黄湯

傷寒門

振寒門

白虎加人參湯

白虎湯下

竹葉石膏湯

白虎湯下

黃耆建中湯

桂枝湯下

桂枝加附子湯

桂枝湯下

戰慄門

大承氣湯

小承氣湯下

麻黃湯

方祖

寒熱門

小柴胡湯

方祖

柴胡四物湯

小柴胡湯下

補中益氣湯

保元湯下

理中湯

方祖

逍遙散

虛損門

外熱內寒外寒內熱門

黃耆建中湯

桂枝湯下

越婢湯

麻黃湯下

理中湯

方祖

火鬱湯

升麻湯下

上熱下寒上寒下熱門

梔子豉湯

方祖

桂苓丸

五苓散下

既濟湯

白虎湯下

既濟解毒湯

三黃湯下

八味丸

方祖

滋腎丸

大補丸下

加減八味丸

八味丸下

五苓散

方祖

○瘡門

蜀漆散

金匱

治牝瘡多寒

蜀漆

即常山苗

雲母

燒二日夜

龍骨

熬等

右杵為散發前以漿水調半錢

即酸漿見四逆湯下漿水散

溫瘡加蜀漆半分臨發時服一

按蜀漆性升上湧頑痰最速雲母性溫最猛二味相需較之常山陽起石更捷太過即以龍骨斂固其津仍取龍性純陽同氣相求佐上藥以發越陰分伏匿之邪則牝瘡之寒自已與桂枝龍骨牡蠣湯火逆湯之義不殊其外臺牡蠣湯用牡蠣蜀漆麻黃甘草四味藥雖異而功用則同蓋蜀漆得雲母則溫散頑痰於內蜀漆得麻黃則溫散寒邪於外亦恐發泄太過即以牡蠣

收歛陰津。仍取其性入陰。有軟堅散結之功也。用甘草者。令以協和中外。則胃氣有權。方得振祛邪作汗之力耳。

達原飲 治疫癘壯熱。多汗而渴。

黃芩 一錢五分

甘草 炙一錢

白芍 一錢

知母 二錢

厚朴 一錢

檳榔 二錢

草薢 一錢

生薑 七片

大棗 一枚

水煎。發前熱。服溫覆。取微汗。

或問疫邪初犯募原。吳又可以達原飲為主方。詳

方中檳榔草菓厚朴俱屬清理腸胃之品。知母直瀉少陰邪熱。與募原何預而用之。荅曰。募原雖附軀殼。貼近於裏。爲經絡藏府之交界。況溼土之邪。從竅而入。以類橫連。未有不入犯中土者。所以清理腸胃爲先。非若傷寒傳次表證未罷。誤用裏藥。則有結胃傳裏之變。卽尚未離表。但須薑棗佐芍。芍甘草以和解之。若見少陽陽明太陽。必兼柴胡。葛根羌活以開泄之。設裡氣不通。勢必盤錯於中。而內陷。則加大黃以攻下之。又可專工瘟疫。歷治。

有年。故立此爲初犯募原之主方。其變後則有白虎涼膈爲鼎足之任。以此推原。其他變證。則三黃雙解。清熱解毒。人中黃丸等方。可默識其微。而用之必當矣。余嘗以此治疫瘧時瘧。靡不應手獲効。總藉以分解中外寒熱諸邪之力耳。

何首烏散 治瘧積滯去後寒熱不止。至夜尤甚。

生何首烏 五錢 青皮 陳皮

甘草 炙各一錢 生薑 七片 大棗 三枚

水煎露一宿。侵晨熱服。

多汗而渴加知母烏梅。虛人腹痛加入參厚朴木香。

七寶飲 治一切實癰。服調理藥不止。

厚朴

常山 醋炒

檳榔

陳皮

青皮

草果 各一錢

甘草 炙七分

生薑 七片

水酒各半煎露一宿。侵晨熱服。 一方多半夏一錢大棗一枚

常山飲 治瘧發晡時至夜熱不止。脈實邪盛者。

常山 醋炒

檳榔

青皮 炒

甘草

當歸各一錢

穿山甲殿八分世本作

木通

黑豆四十粒

生薑七片

水酒各半煎露一宿侵晨熱服

龜甲煎丸余圓

治癰母一切痞積

龜甲灸一兩二錢

柴胡

芍藥

牡丹

鱉蟲熬

烏扇燒

鼠婦煨

蛭蟥熬各四錢

桂枝千金作桂心

阿膠各三錢

黃芩

桃仁

乾薑

大黃

半夏

人參

厚朴

蜂房

炙各二錢

石葦去毛

紫葳

各二錢半

葶藶

瞿麥

各一錢半

赤石

一兩

右二十三味爲末。取鍛竈下灰一斗。清酒一斛。浸

灰候酒盡一半。濾去灰。著鼈甲於中。煮令泛爛如

膠漆。絞取汁。納諸藥末。煎爲丸。如梧子大。空心服

七丸。日三服。

千金無鼠婦。亦謂多海藻。大戟。

此方妙用。全在鼈甲之用。灰淋酒煮如膠漆。非但

鼈甲消積。酒淋灰汁。亦善消積。較瘡母丸之用醋

煮功用百倍

瘡母丸 治瘡痞結於左脇硬痛

青皮

桃仁

神麴

麥芽

各一兩四錢俱炒

鹽

三兩

山稜

蓬朮

海粉

即蛤粉各五錢

香附

二兩五味俱醋煮

紅花

三錢

神麴糊丸 梧子大每服七八十丸空心淡薑湯下

白虎湯

方祖

白虎加桂枝湯

白虎湯下

柴胡去半夏加枳實湯

小柴胡湯下

柴胡桂薑湯

湯小柴胡

一陳湯

方祖

柴胡桂枝湯

湯小柴胡

人參養胃湯

散平胃

清暉飲

湯小柴胡

補中益氣湯

湯保元

人參實衛湯

湯保元

白虎加人參湯

湯白虎

胃苓湯

散平胃

理中湯

方祖

小建中湯

湯桂枝

黃耆建中湯

湯桂枝

六味九

丸八味

當歸內補建中湯

湯桂枝

京膈散

方祖

大柴胡湯

湯小柴胡

人參敗毒散

湯小柴胡

逍遙散

散疏肝

六君子湯

湯四君子下

四獸飲

湯四君子下

芎歸鼈甲飲

湯四物下

清暑益氣湯

湯保元下

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯下

八味丸

方祖

厥門

四逆散

柴胡下

四逆湯

方祖

附子理中湯

湯理中下

加減八味丸

丸八味下

清暑益氣湯

湯保元下

犀角地黄湯

湯傷寒下

地黃飲子

中風下

八味丸

方祖

承氣湯

方祖

二氣丹

金液丹下

五苓散 方祖

白虎湯 方祖

人參七氣湯 方祖

氣門

烏沉湯 局方

治一切冷氣及婦人血氣攻擊心腹

撮痛

天台烏藥

沉香

人參

各一兩

甘草

炒五錢

右四味爲末每服半兩入生薑三片煎成入食鹽

一字熱服

沉香降氣散

局力

治一切氣滯胸膈不舒婦人經

癸不調少腹刺痛

沉香

四錢

甘草

炙八錢

砂仁

炒四錢

香附

童便浸去外皮微炒二兩

右四味爲散每服二錢入鹽一字沸湯調服

木香調氣散

治氣滯胸膈虛痞嘔逆刺痛

白豆蔻

去殼

丁香

木香

檀香

各二錢

藿香

甘草

炙各八分

砂仁

四錢炒

右爲散每服二錢入鹽一字沸湯調如稠糊晨夕各一服或滴水爲丸服二錢

本方加人參白朮茯苓山藥橘皮青皮萆澄茄各育氣散治虛寒腹痛進飲食

四磨湯 治一切氣塞痞悶不舒不時暴發

沉香

烏藥

檳榔

人參

右等分酒磨各約半錢入鹽一字沸湯點服或磨上三味倍用人參煎湯入鹽調服

六磨湯

四磨湯加枳殼木香

按四磨湯雖用人參實爲散氣之峻劑蓋槓沉烏藥得人參助之其力愈峻服後大便必有積沫下後卽寬若六磨更加破氣二味下氣尤迅近世醫人以氣滯不敢用參但用諸破氣藥磨服殊失本方之旨

沉香化氣丸 治食積痰氣痞脹妨食

人黃 酒蒸

條黃芩

各二兩

人參

白朮各三

兩

沉香

五錢
另研

右將前四味剉碎用薑汁竹瀝七浸七曬候乾爲末和沉香末再研神麴糊丸水飛硃砂爲衣曬乾勿見火每服二錢淡薑湯送下小兒量減

此仿王隱君滾痰丸之製去礞石加參朮以祛食積痰飲雖較滾痰丸稍遜然二黃得參朮以鼓其勢亦是突圍猛帥勿以其中有參朮視爲兼補漫施以伐後天爲害非淺鮮也

四七湯

二陳湯下

局方七氣湯

方祖

二陳湯 方祖

理中湯 方祖

六君子湯

四君子湯下

蘇子降氣湯

七氣湯下

導痰湯

二陳湯下

神保丸

傷飲食門

蘇合香丸

中風門

異功散

四君子湯下

三四七氣湯

七氣湯下

八味丸

方祖

鬱門

越鞠丸

治諸鬱痞悶

香附

黃便浸

蒼朮

泔浸去粗皮麻油炒

撫芎

重便浸各二兩

山梔

薑汁炒黑

神麴

炒香各兩五錢

滴水爲丸。菜豆大。每服百丸。白湯下。陰虛多火。禁用。

越鞠者。若人鞠。屈鬱伏。忽爾其氣發越也。香附理氣。鬱蒼朮開溼鬱。撫芎調血鬱。梔子治火鬱。神麴消食鬱。總以理氣爲主。若溼鬱加白朮茯苓。熱鬱加青黛黃連。痰鬱加半夏海石。食鬱加枳實山查。血鬱加桃仁肉桂。氣鬱加木香砂仁。此因病變通之大畧也。

火鬱湯

升麻湯下

承氣湯

方廣

利金湯

枯梗湯下

二妙散

大補丸下

半夏厚朴湯

二陳湯下

逍遙散

虛損門

佐金丸

方祖

四君子湯

方祖

六味丸

八味丸下

歸脾湯

保元湯下

蘇子降氣湯

七氣湯下

四烏湯

四物湯下

痞滿門

五膈寬中散

治七情

結痰氣痞塞遂成五膈

厚朴

薑汁炒二兩

甘

炙一兩

木香

五錢

白豆蔻仁

三錢

爲散每服三錢加生薑三片水煎入鹽一字和滓服

丁沉透膈湯

五膈寬中散加丁香沉香半夏草果人參白朮

香附砂仁生薑大棗水煎服一方多青皮陳皮神麴麥芽

增損流氣飲治諸氣鬱滯胸膈痞滿面目浮腫

半夏

十小茯苓

陳皮各一錢

甘草

炙五分

蘇葉

香附

檳榔

大便秘者去之

木香

大腹皮

枳殼

桔梗各七分

人參一分錢

肉桂

厚朴薑製各八分

生薑七片

紅棗二枚

水煎熱服

按十六味流氣飲。以二陳加入破氣諸藥。雜合成劑。施之藜藿。往往。凡應。遂為名方。其本香流氣飲。依傍局方七氣金。以四七。似覺彼善於此。然亦雜亂無章。至於分心。流氣飲。分氣紫蘇飲。皆彷彿流氣風斯愈。下今止。取水香流氣。刪其繁蕪。以為存。

半之意。

木香檳榔丸

寶鑑

治一切滯氣。心胸腹脇痞滿。太

小便瀯滯不快。

木香

檳榔

枳殼

炒

青皮

炒

陳皮

炒

廣茂

炭

黃連

各一兩

黃檗

炒

香附

醋炒

大黃

酒蒸

牽牛

腹滿便秘用黑者喘滿隔塞用白者取頭末各二兩

滴水爲丸。豌豆大。每服三五十九至七十九。食遠

薑湯送下。以利爲度。

本方去陳皮廣茂香附黃連黃檗大黃牽牛加杏
仁半夏皂角郁李仁蜜丸薑湯下五十九卽御藥
院木香檳榔丸專主痰痞風秘寶鑑方治氣痞熱
秘各有攸宜。

補中益氣湯

保元湯下

連理湯

理中湯下

乾薑黃芩黃連人參湯

瀉心湯下

瀉心湯

方祖

指迷七氣湯

七氣湯下

理中丸

方祖

小陷胃湯

傷寒門

三黃湯

方祖

二陳湯

方祖

小柴胡湯

方祖

平胃散

方祖

枳實理中湯

理中湯下

橘皮枳實生薑湯

胸痺門

九味資生丸

四君子湯下

六君子湯

四君子湯下

清暑益氣湯

保元湯下

異功散

四君子湯下

局方七氣湯

方祖

腹滿門

中滿分消湯

治中滿寒脹

半夏 一錢

厚朴

黃連

黃檗

上四味俱薑製

川烏

炮

乾薑

炮

吳茱萸

淨用開水者炒 草豆蔻 炒研

木香

人參

各五分

茯苓

澤瀉

各一錢五分

生薑

五片

右水煎稍熱食前服。大忌房勞。生冷炙煨酒麪糟醋鹽醬等物。

身熱脈浮喘滿有表證。加麻黃五分。血虛至夜煩熱。加歸身黃耆各五分。陽氣下陷。便溺赤澀。加升麻柴胡各三分。脾胃虛寒。飲食不磨。去黃蘗加益智仁革澄茄青皮各二分。

中滿分消丸 治中滿熱脹

厚朴

半夏

黃連

三味俱薑汁炒

黃芩

枳實

白朮

二味同拌溼炒焦

乾生薑

茯苓

豬苓

澤瀉

人參

各五錢

甘草

炙一錢

湯浸蒸餅為丸。梧子大。每服百丸。食後沸湯下。

脾胃氣滯。食積脹滿。加陳皮。砂仁。各五錢。經脈溼

滯。腹皮腿臂痛。不可拊者。加片子薑黃。一錢。肺熱

氣化不行。溺秘喘渴者。加知母。三錢。

東垣分消湯丸一主溫中散滯一主清熱利水原
其立方之旨總不出內經平治權衡去菀陳莖開
鬼門潔淨府等法其方下所指寒脹乃下焦陰氣
逆滿鬱遏中焦陽氣有似乎陰之象故藥中雖用
烏頭之辛熱宣布五陽爲辟除陰邪之嚮導卽用
連轆之苦寒以降泄之苟非風水膚脹脈浮證起
於表者孰敢輕用開鬼門之法以鼓動其陰邪四
塞乎熱脹用黃芩之輕揚以降肺熱則用猪苓澤
瀉以利導之故專以潔淨府爲務無事開鬼門宣

布五陽等法也

附子粳米湯

金匱

治腹中寒氣雷鳴切痛胸腹逆

滿嘔吐

附子

薑汁炮切

半夏

薑汁炒

甘草

炙各三錢

大棗

擘十枚

粳米

半升

右五味以水五升煮米熟湯成去滓溫服一升日

三服○良方但用薑汁製附子一味煮粥食之

溫胃湯

千金

治胃氣不平時脹欬不能食

附子

當歸

厚朴

人參

橘皮

芍藥

甘草

各三錢

乾薑

四錢

蜀椒

一合

右九味。㕮咀。以水九升。煮取三升。分三服。

大承氣湯

湯下 小承氣

大芫胡湯

湯下 小柴胡

厚朴七物湯

湯下 小承氣

厚朴三物湯

湯下 承氣

當歸龍薈丸

湯下 三黃

四物湯

方祖

四君子湯

方祖

藿香正氣散

散下 平胃

沉香降氣散

氣門

局方七氣湯

方祖

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯下

附子理中湯

理中湯下

濟生腎氣丸

八味丸下

枳實導滯丸

傷飲禁門

水腫門

疏鑿飲

治水氣通身浮腫煩躁喘渴小便不利

澤瀉

商陸

赤小豆

羌活

大腹皮

淨

椒目

木通

秦艽

茯苓

檳榔

各七分

生薑

三片

水煎頓服

出功散

治陽水便秘脈實初起元氣未傷者

黑牽牛

頭末四兩

茴香

炒

木香

各一兩

為散。每服二錢。加生薑自然汁。調如粥飲服。

沉香琥珀丸 治血結小腹青紫筋結而急脹痛

琥珀

另研

杏仁

一作桃仁

蘇合

赤茯苓

澤瀉

各五錢

葶藶

隔紙焙

郁李仁

去皮各一兩

沉香

另研

陳皮

防己

酒洗各五錢

麝香

一錢

蜜丸。棗豆大。每服四五十九。加至百。凡空心人參

湯下。

三白散 治陽水囊腫二便不通

白牽牛

頭末二兩

桑白皮

薑汁炒

白朮生用

陳皮

木通

各一兩

為散。每服二錢。空心淡薑湯送下。未效再服。

實脾散 治陰水發脾。宜此先實脾土。

白朮

炒焦

附子

炮

乾薑

炮

茯苓

木香

木瓜

草果仁

厚朴

薑製

大腹子

各一兩

甘草

炙五錢

爲散。每服四錢。加生薑五片。棗一枚。水煎服。
治水以實脾爲先務。不但陰水爲然。方下所云治
陰水發腫。宜此先實脾土。儼然陰水當溫散。陽水
當寒瀉之旨。橫於胸中。夫陰水因腎中真陽衰微。
北方之水不能蟄藏。而泛溢無制。倘腎氣不溫。則
真陽有滅頂之凶矣。實土堤水。寧不爲第二義乎。
何方中不用肉桂辛溫散結。反用木瓜厚朴大腹
子耶。卽有滯氣當散。厚朴尚可。若大腹子之
開泄大便。斷乎不可妄用也。

復元丹 治脾腎俱虛。變為水腫。

附子炮二兩

白朮炒焦

肉桂

吳茱萸陳去閉口者炒 川椒炒去

茴香

木香

厚朴製各

澤瀉炒

肉果煨各半兩

茯苓一兩五錢

為末陳米飲糊丸梧子大每服五七十丸紫蘇湯

或砂仁湯送下

五皮散局方

治溼熱積於脾經。面目四肢浮腫。

五加皮

地骨皮

大腹皮

扶苓皮

生薑皮

等分

爲散每服五錢水煎熱服

瘡寮方去骨皮加皮加桑皮橘皮治喘而腹滿

五子五皮湯

五皮散加紫蘇子萊菔子香附子車前子葶藶

子○一方無香附子多大腹子加生薑煎服

椒仁丸

治婦人先因經水斷絕後至四肢浮腫小

使不利血化爲水名曰血分

椒仁炒

甘遂

續隨子

去皮即千金子

附子炮

郁李仁去皮

黑牽牛頭末

五靈脂

酒研去砂土

當歸

吳茱萸

揀淨湯泡以

延胡索

各五錢

芫花

醋炒二錢

訶青

十枚去翅足糯米炒

膽礬

白礞

各一錢

石膏

三錢

爲末。麴糊丸。豌豆大。每服一九。空心橘皮湯下。

葶藶丸 治先因小便不利。後至四肢浮腫。名曰水

分。

甜葶藶

隔紙煨

續隨子

去皮各五錢

乾笋末

一兩

爲末。煮紅棗肉爲丸。梧子大。每服七丸。煎扁蓄湯

送下大便利者禁用

人參丸 治月經不利血化為水四肢浮腫亦曰血分

人參

當歸

大黃

酒蒸

蘿麥穗

赤芍藥

赤茯苓

肉桂

各二兩

苦葶藶

熬一兩

為末煉白蜜丸梧子大每服十五丸空腹米飲下

防已黃耆湯

方祖

越脾湯

蘇黃湯下

防已茯苓湯

防已黃耆湯下

蒲灰散

益元散下

麻黃附子湯

麻黃湯下

杏子湯

麻黃湯下

越婢加朮湯

麻黃湯下

薤芎桂酒湯

桂枝湯下

桂枝加黃薤湯

桂枝湯下

桂枝去芍藥加麻辛附子

湯

桂枝湯下

枳朮湯

方祖

清川散

三黃湯下

神祐丸

十棗湯下

神芎丸

三黃湯下

五苓散

方祖

理苓湯

理中湯下

六君子湯

四君子湯下

濟生腎氣丸

八味丸下

金液丹

方祖

真武湯

朮附湯下

小青龍湯

桂枝湯下

蘇子降氣湯

七氣湯下

除溼湯

平胃散下

增損流氣飲

痞滿門

葶藶木香散

五苓散下

胃苓湯

平胃散下

羌活勝溼湯

溼門

歸脾湯

保元湯下

金液丹

方祖

鼓脹門

雞矢醴

素問

治鼓脹內有溼熱停積日食不能暮

食

騙雞矢白

但與陳米煨養勿與雞食則矢乾有白

右取八合微炒入無灰酒三升煮取一升五合五

更熱服

如無以不落水雞內金炙脆為末荷葉裹陳米飯為丸每服二三錢空心溫酒送下

此方出黃帝內經世本有加大黃桃仁者大謬

啟峻湯 治脾腎俱虛腹脹少食

人參

黃耆

當歸

白朮

炒枯各一錢五分

陳皮

八分

甘草

炙五分

肉桂

半錢

茯苓

一錢五分

乾薑

炮四分

肉果

沉香

各八分

附子

炮一錢五分

水煎溫服

氣滯硬滿者去黃耆加厚朴此方出醫林黃治啟

東之方不多見。僅一藥耳。

散血消脹湯 治血脹小便多大便澹黑光亮。

歸尾

一錢五分

五靈脂

觀桂

烏藥

甘草

炙

木香

各六分

川芎

一錢二分

半夏

蓬朮

煨各八分

紫蘊

三分

砂仁

一錢炒

生薑

五片

水煎食前溫服。

琥珀人參丸

治血蠱

人參

五靈脂

各一兩

琥珀

肉桂

附子生各五錢

赤茯苓

川芎

沉香

穿山甲各三錢

爲末煎蘇方汁爲丸每服二錢早暮溫酒各一服

此人參與五靈脂並用最能濬血血蟲之的方也

二陳湯方祖

中滿分消湯腹滿門

中滿分消丸腹滿門

下瘀血湯抵當下

六君子湯四君子湯下

平胃散方祖

五苓散方祖

金匱腎氣丸八味丸下

小建中湯

桂枝湯下

蘇合香丸

中風門

黑錫丹

金液丹下

大黃附子湯

承氣湯下

積聚門

奔豚湯

金匱

治腎積上貢犯肺喘脹發熱

甘草

芍藥

白芍

當歸

黃芩

各一錢

半夏

甘李根白皮

葛根

各二錢

生薑

三片

右九味水煎溫分四服日三夜一以積下小腹減爲

度不應加戎鹽一字

千金無甘草黃芩有吳茱萸石膏人參茯苓桂心

赤丸 金匱

治寒積厥逆

茯苓

半夏

各四兩一方用桂

烏頭

二枚炮

細辛

一兩千金作人參

右因味爲末內真朱

砂卽硃

爲色蜜丸如麻子大先

食酒下三丸日再夜一服不知稍增以知爲度

千金

無半夏有附子桂心射罔

普濟方用白鳳仙子一錢小川烏二枚半夏三枚

杏仁四十九粒各生搗爲末紅棗肉九梧子大黃

丹爲衣早暮各服七丸俱溫酒下若治小兒丸如

粟米大量用三五丸。待穀道血出。任服。忌大輩生
冷腐醋等物。此方與赤丸功效相類。故附於此。
此方烏頭與半夏同劑。用相反以攻堅積。沉寒非
妙達先聖至理。不能領畧其奧。與胡洽治膈上積
用十棗湯加甘草大戟同一妙義。而普濟方僅用
烏頭半夏二味。易白鳳仙子杏仁黃丹爲衣服。七
丸至穀道見血而止。其瞑眩之性可知。蓋藥之相
反相惡。不過兩毒相激。元非立能傷人。後世以爲
相反之味。必不可同用。陋哉。

喬氏陰陽攻積丸

治寒熱諸積

吳茱萸

乾薑

炮

觀桂

川烏

炮

黃連

薑汁拌炒

半夏

薑製

茯苓

延胡索

人參

各一兩

沉香

另研

琥珀

另研各五錢

巴豆霜

另研一錢

爲末皂角四兩煎汁糊丸棗豆大每服八分加至一錢五分薑湯下與脾胃藥間服

此方出土材先生必讀先生向寓郭園曾以此方授之郭嫗云是喬三餘所定方中萸桂走肝乾薑

入脾烏頭達腎專取辛烈以破至陰之固壘半夏
茯苓以開痰蔽延胡琥珀以散血結沉香以通氣
閉巴霜以蕩堅積黃連以除旺氣人參以助諸味
之力也其所授郭姬之方酒麴糊丸較之皂角汁
稍平妙用全在與脾胃藥間服予曾效用此方每
以六君去木倍苓加肉桂當歸米飲糊丸或朝服
增損六君又用陰陽攻積或服攻積一日六君二
三日隨人強弱而施但初服未嘗不應積勢向衰
卽當停服所謂衰其大半而止專力補脾可也

耆婆萬病丸 治七種痞塊五種癰病十種注忤七
種飛尸十二種蠱毒五種黃病十二種瘧疾十種
水病八種大風十二種癰癰并風入頭眼暗漠漠
及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得眠卧飲食不作
肌膚五藏滯氣積聚不消塞閉不通心腹脹滿及
連胸背鼓氣堅結流入四肢或復叉心膈氣滿時
定時發十年二十年不瘥五種下痢瘡蟲寸白諸
蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡消瘦無力陰入
骨髓便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四

肢沉重。行立不能久。婦人因產冷入于藏。藏中不
淨。或閉塞不通。胞中瘀血冷滯。出流不盡。時時疼
痛。為患。或因此斷產。并小兒赤白下痢。及狐臭耳
聾。鼻塞等病。此藥以三丸為一劑。服藥不過三劑。
萬病悉除。說無窮盡。故稱萬病丸。

牛黃

麝香

犀角

镑

桑白皮

剉炒

茯苓

乾薑

炮

桂心

當歸

芍藥

芍藥

甘遂

黃芩

蜀椒 去目及閉口者炒出汗

細辛

桔梗

巴豆 去皮心膜炒

前胡

紫苑 去蘆

蒲黃 微炒

葶藶 炒

防風

人參

朱砂

雄黃 油煎

黃連 去鬚

大戟 剉炒

禹餘糧 醋熬

芫花 各一錢六分醋炒赤蜈蚣六兩去頭足炙

百蜥蜴 一寸去頭足炙芫青十四枚人糯米同炒

右三十一味 崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風為二十七味 並令精細牛

黃麝香犀角朱砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合

擣重絹下篩。以白蜜和更擣三千杵。密封下。破除
日。平旦空腹酒服三丸。如梧子大。取微下。三升惡
水爲良。若卒暴病。不拘平旦早晚皆可服。但以吐
利爲度。若不吐利。更加一丸。或至三丸五丸。須吐
利爲度。不得限以丸數。病強藥少。卽不吐利。更非
他故。若其發遲。以熱飲汁投之。若吐利不止。卽以
酢飯兩三口止之。服藥忌陳臭生冷酢滑粘食。大
蒜猪雞魚狗牛馬驢肉白酒行房七日。外始得一
日服二日補之。得食新米韭根汁作羹粥。臞飲食。

之三四頓大良。亦不得全飽。產婦勿服。吐利後以常須閉口少語。於無風處溫牀暖室將息。若旅行卒暴無飲。以小便送之為佳。若一歲以下小兒有疾者。令乳母服兩小豆。亦以吐利為度。近病及卒病皆用。多積久疾病。即少服。常取微瀉利為度。其細

證服法註解並詳千金衍義膽府門本方下

木香通氣散 治寒氣成積腹痛堅滿不可忍

木香 戎鹽 三稜炮各半兩

厚朴薑製一兩 枳實炒 甘草炙各三錢

乾薑炮

蓬朮煨各二錢

爲散每服三錢。食前淡薑湯調下。

四味阿魏丸 治肉積發熱

山楂肉薑汁炒一兩 連翹仁

黃連薑汁炒各五錢

爲末。易用阿魏一兩醋煮糊丸。麻子大。每服二十丸。至三十丸。食前沸湯下。脾胃虛人。六君子湯下。和血通經湯 治婦人寒客胞門。月事不來。結爲石。瘕及一切血結成積。

當歸

熟地黃

蘇木各錢

三稜炮

廣茂山

木香

貫衆

肉桂各八分

紅花三分

血竭五分

食前紅酒煎服忌酸醋生冷之物

見睨丸 治寒氣客於下焦血氣閉塞而成石瘕腹

中堅大久不消者

附子炮去皮

鬼箭羽如無鱗鯉甲代之肥人

紫石英各三錢

澤瀉肉桂勿見

延胡索

木香各二錢

檳榔二錢

血竭

一錢五分

水蛭

一錢如無

桃仁

三十粒去

灰并炒
去漆灰

京三稜

五錢

大黃

三錢剉用
酒同三稜

浸一宿焙

右十三味除血竭桃仁外同為末八另研二味和

勻紅酒打糊丸如桐子大每服三十丸淡醋湯下

食前溫酒亦得虛者去水蛭三稜加人參一兩當

歸五錢虛其用十全大補湯送下

阿魏麝香散

治腸覃諸積瘕塊

阿魏 五錢

麝香 一錢

雄黃 三錢

野水莊花子

四兩神麴炒

人參

白朮

生各一兩

肉桂

五錢

右爲散每服三錢用烏芋

卽芋薺

三箇去皮搗爛和

藥早晚各一服砂仁湯過口

三因化氣散 治息積上下賁脹

肉桂

勿見火

蓬朮

煨

青皮

炒

陳皮

乾薑

炮

沉香

另研勿見火各五錢

木香

甘草

炙

丁香

胡椒

砂仁

各二錢炒

茴香

炒四錢

爲散每服三錢薑蘇鹽湯調下。婦人醋湯調服。
阿魏膏 治一切瘡塊

羌活

獨活

黑參

觀桂

赤芍

穿山甲 瘡

生地黃

猥鼠糞

大黃

白芷

天麻

各五錢

紅花

槐柳枝

各三錢

土木髓

二十枚 去殼

右用真麻油一觔浸春五夏三秋七冬十日煎黑去滓人亂髮雞子大一握再熬濾清徐下真黃丹

煎較軟硬得中入芒硝阿魏乳香沒藥各五錢取
起離火再入蘇合香油半兩麝香三錢調勻成膏
磁器收藏臨用時取兩許攤大紅紵上貼患處內
服健脾消積開鬱藥凡貼膏須正當痞塊不可偏
偏則隨藥少處遞去卽不得力貼後以綿紙掩用
芪硝隨患處鋪半指厚用熱熨斗熨一時許日熨
三次硝耗再加月餘藥力盡其膏自脫便愈年久
者連用二膏無不消盡若是肝積見於左脇加蘆
薈末和硝熨之倘積去於所遞處再貼一膏必仍

歸舊案矣

普濟方無羌活黑參白芷天麻生地赤芍多川烏
南星半夏甘遂甘草人參五靈脂各五錢

鷓鴣丸 治食魚鼈成痞此方最捷餘俱不効

鷓鴣

一隻去毛水酒各半煮爛入阿魏五錢更

水荳花子

六兩白朮二兩

阿魏

一兩

神麴

茯苓

當歸

各一兩

橘紅

甘草

炙各五錢

爲末加生薑自然汁半杯入煉白蜜丸彈子大細

嚼一九沸湯或溫酒過口早暮各一服

阿魏化痞散 治瘡痞寒熱及痃瘕虛人禁用

川芎

當歸

白朮

赤茯苓

紅花

阿魏

各一錢

鼈甲尖

酥炙脆三錢

大黃

酒炒八錢

蕎麥麴

一兩

爲散每服四錢好酒一盞調稀糊服服後三日腹

痛見膿血爲驗忌生冷油膩大葷蠶麩等物

金匱三物大建中湯理中湯下金匱大黃附子湯小承氣湯下

大七氣湯局方七氣湯下

六君子湯四君子湯下

五苓散

方祖

導痰湯

二陳湯下

理中湯

方祖

十全大補湯

保元湯下

痰飲門

甘遂半夏湯

金匱

治病者脈伏。自利反快而渴。雖

利心下續堅滿。此為留飲欲去故也。

甘遂

大者三枚

半夏

十二枚薑湯泡去涎水

芍藥

半枚

甘草

如指大一枚炙

右四味水煎去滓。以蜜半杯和服。

按甘遂與甘草相反。而一方並用。乃瀉痰逐飲之

峻劑非聖於治者不敢擬議也

木防已湯

金匱

治支飲心下痞堅脈沉而黑吐下

不愈者

木防已

三錢

石膏

雞子大一枚

桂枝

二錢

人參

四錢

水煎溫分再服

木防已去石膏加茯苓芒硝湯

金匱

木防已湯減防已一錢去石膏加茯苓芒硝各

四錢

水煎去滓。內芒硝。再微煎。分溫再服。微利則愈。

葶藶大棗瀉肺湯 金匱 治支飲喘不得息。肺癰喘

不得卧。

葶藶

熱黃芩丸
加彈子大 大棗 十二枚

右二味。以水三升。煮取一升。分溫再服。則吐膿血。

已椒藶黃丸

金匱
各椒目九 千金

治腹滿口乾燥。此腸胃

間有水氣。

防已

椒目

葶藶

大黃

各兩

右四味求之蜜丸如梧子大先食飲服十九日三服稍加口中有津液渴者加苾稍半兩

倍术丸

局方

治五飲留伏腹中鳴轉淥淥有聲

白术

薑汁拌
曬二兩

乾薑

炮

肉桂

勿見火
各一兩

神麴糊丸每服五七十九丸食前淡薑湯下

青礞石丸

治中外老痰胸膈痞悶經絡四肢不遂

青礞石

硝煨
五錢

半夏

一兩

風化硝

三錢

白朮

生

橘紅

五錢

茯苓

八錢

黃芩

四錢

神麴糊丸。空心淡薑湯下二錢。

滾痰丸。

一名王隱君滾痰丸。一名礞石滾痰丸。一名沉香滾痰丸。

治諸實熱積。

痰異證。孕婦勿服。

青礞石。

色青者良。三兩同焰硝三合入煬成礞石。內赤石脂封護煨過水飛淨二兩。

沉香。

另研一兩。

川大黃。

酒蒸八兩。

黃芩。

酒炒八兩。

爲末。水泛爲丸。菜豆大。每服一錢至二錢。食遠拂。

湯下。

原方礞石一兩沉香五錢。張景岳倍之。

沉香化痰丸。

治胸中痰熱積年痰火無血者宜服。

半夏麴。

八兩。川薑汁一小杯。竹瀝一大盞製。

黃連。

二兩薑汁炒。

木香 一兩

沉香 一兩

爲細末甘草湯泛爲丸空心淡薑湯下二錢

運痰丸 治脾虛熱痰堵塞膈氣不舒

沉香化痰丸半料合四君參朮茯苓各三兩甘

草一兩

消痰餅子 治老痰結於喉中燥不得出

栝蒌仁

壓去油取霜

杏仁

去皮尖研如脂

海石

煨

桔梗

連翹

風化硝

等分

先用生薑自然汁少許拌加煉白蜜丸彈子大不

時翕化一九

倒倉法 治藏府腸胃經絡宿滯諸藥不効者

夏月三伏中揀肥嫩黃牛肉四蹄各七八觔切作小片去筋膜入砂鍋中長流水煮糜爛搗絞取汁三次去滓以汁入鍋內漫火熬至琥珀色爲度膠成隔水頓鍋中時添微火則不冷不餒須預先斷肉食淡三日前一日勿食晚飯於明亮密室中不通風處行之置穢桶瓦盆貯所下之物以新磁瓶盛示出之溺令病者入室以膠汁飲一杯少頃又

飲一杯。積數十杯。自然吐利。視所出之物。必盡。病根乃止。吐利後。必渴甚。不可與湯。以所出之溺。乘熱飲之。以蕩滌餘垢。行後。倦怠覺饑。先以米飲。次與淡稀糜。三日後。方可稍食菜羹。調養半月。或一月。自覺精神煥發。形體輕健。沉痾悉去矣。白後終身。須忌牛肉。永不復發。如有餘膠。熬如鹿角膠收藏。卽霞天膠。可入補劑。

瓜蒂散 治寒痰結於膈上。及溼熱頭重鼻塞。

瓜蒂

一分

赤小豆

二分

右二味各別搗篩爲散已合治之取一錢匙以香
豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫
頓服之不吐者少少加得快吐乃止

苓桂朮甘湯

桂枝湯下

腎氣丸

八味丸下

十棗湯

方服

大青龍湯

麻黃湯下

小青龍湯

桂枝湯下

澤瀉湯

五苓散下

厚朴大黃湯

承氣湯下

小半夏湯

二陳湯下

小半夏茯苓湯

二陳湯下

五苓散

方用

半夏厚朴湯

二陳湯下

桂苓丸

五苓散下

二陳湯

方祖

六君子湯

湯四君子下

利金湯

湯杜枝下

十味導痰湯

湯二陳下

千緡湯

湯二陳下

涼膈散

方祖

八味丸

方祖

導痰湯

湯二陳下

控涎丹

湯十棗下

局方七氣湯

方祖

小陷胸湯

湯傷寒門

四七湯

湯二陳下

指迷茯苓丸

湯二陳下

深師消飲丸

湯杜枝下

外臺茯苓丸

湯四君子下

溫膽湯

湯二陳下

理中湯

方祖

加味歸脾湯

湯保元下

加味逍遙散

門虛損

六味丸

八味丸下

異功散

四君子湯下

二冬膏

方祖

真武湯

附方下

補中益氣湯

保元湯下

枳朮丸

方祖

欬嗽門

桂苓五味甘草湯

金匱

治欬逆氣從小腹上衝

桂枝

茯苓

各四錢

甘草

炙三錢

五味子

二錢

水煎去滓溫分三服

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯 金匱

桂苓五味甘草湯去桂枝加乾薑細辛各三錢

嘔逆更加半夏二錢形腫更加杏仁二錢面赤如

醉更加大黃三錢

射干麻黃湯

金匱射干音夜

治欬而上氣喉中水雞聲

射干 三錢

麻黃 去節四錢

細辛 一錢

紫苑

欬冬花 各三錢

五味子 一錢

半夏 二錢洗

生薑 四片

大棗 二枚擘

先煮麻黃去上沫內諸藥湯成去滓溫分三服

厚朴麻黃湯 金匱

治欬而脈浮上氣胸滿喉中不

利如水雞聲

厚朴 半兩

麻黃 去節四錢

石膏 雞子大碎

杏仁 去皮尖半兩

半夏 洗半兩

乾薑 二錢

細辛 一錢

五味子 半錢

小麥 一合

先煮小麥去滓內諸藥湯成去滓分溫三服

按此本麻杏甘石越脾半夏及大小青龍之製主

以厚朴辛溫散氣使以小麥補肝助胃西北二方

發汗之首劑也

澤漆湯金匱

治欬而脈沉上氣咽喉不利。

澤漆

一兩銖大戟苗

白前

形如細辛而白產徽州砂石水中歲人藥肆中見之

紫參

如無紫苑代之

半夏

洗各錢半

桂枝

千金作桂心

人參

甘草

黃芩

各一錢

生薑

四片

右九味先煮澤漆去滓內諸藥湯成去滓溫服至

夜盡

麥門冬湯

金匱

治火逆上氣咽喉不利

麥門冬

去心一兩

半夏

洗錢半

人參

一錢

甘草

炙六分

粳米

半合

大棗

四枚

右六味水煎溫分日三夜一服

按此卽白虎加人參湯去石膏加麥冬半夏大棗是也

金沸草散

治肺感風寒欬嗽鼻塞聲重

旋復花

卽金沸草

麻黃

去節蜜製

前胡

各七

荆芥穗

半夏

甘草

炙

芍藥

各五

生薑

三片

大棗

一核

水煎去滓濾清溫服

清風散 局方

治風熱欬嗽。遍身疥癩。小兒瘡疹餘

熱。

川芎

羌活

防風

荆芥穗

藿香

人參

茯苓

僵蠶

蟬蛻 等分

甘草 炙

陳皮

厚朴 薑製

右十二味爲散。每服三四錢。茶清調下。或用五錢

水煎去滓服。如久病頭風目昏。每日三服。效。

此方妙用。全在厚朴人參。當知肌表之疾。無不由

胃而發。故用厚朴清理其內。卽以人參助諸風藥。消解風熱於外。則羌防荆芥輩。方始得力耳。

瀉白散 治肺熱欬嗽手足心熱。

桑根皮

薑汁和蜜炙

地骨皮

各一兩

甘草

炙五錢

爲散。每服四五錢。入梗米百粒。竹葉一把。水煎服。加橘紅。積梗。名加味瀉白散。有熱更加知母黃芩。如有客邪禁用。

或謂地骨皮三焦氣分藥。瀉白用之何義。答言三焦屬腎。實則瀉其子也。門人曰。唯吾道一以貫之。

蘆吸散 治冷哮寒嗽喘促痰清但肺熱者禁用

款冬花

川貝母

六分

肉桂

甘草

炙各三錢

鴛管石

五錢 殷即鍾乳之類者

為極細末以蘆管吸少許嚥化嚥之日五七次

此即宣明焚香透膈散之變法彼用雄黃佛耳此

用桂心貝母甘草彼取無形之氣以散肺中之伏

寒此用有形之散以搜肺絡之伏飲藥雖相類而

用法懸殊總取鐘乳款冬之溫肺利竅也

補肺湯

千金

治肺胃虛寒欬嗽

五味子 一錢

乾薑

桂心

款冬花

麥門冬 去心各三錢

桑白皮 薑汁和蜜炙黃

二錢

大棗 三枚擘

水 煮溫分三服

紫菀茸湯 改定

治傷酒湊肺發欬痰中見血

紫菀茸 三錢

薇衛

白朮 於潛者良半用

澤瀉 各一錢

牡丹皮

麥門冬 去心各錢半

犀角 八分

甘草 炙三分生二分

煎汁 半盞

右九味水煎食遠服。瘦人隱虛多火忌用燥藥

去白朮易白芍藥一錢兼傷肉食 膈膨脹去犀

角芍藥加炮黑山楂肉三錢炒 實一錢

紫苑散 治欬唾有血虛勞肺痿

紫苑茸

人參 各二兩

麥門冬 去心

桔梗

茯苓

阿膠

川貝母

去心各一兩

五味子

甘草

炙各五錢

為散每服四五錢水煎去滓服

紫苑膏 治肺熱欬嗽肌膚灼熱面赤如醉

紫苑茸 二兩

欬冬花 一兩

杏仁 泡去皮尖炒研

枇杷葉

制去毛
蜜水炙

木通

桑根皮

蜜炙

大黃

酒蒸各
半兩

熬膏蜜收不時嚥化一二匙中病即止不可過服。

久嗽去杏仁大黃煎成加童便半盞。

小青龍湯

桂枝湯下

異功散

四君子湯下

六味丸

八味丸下

桂枝二越婢一湯

桂枝湯下

小青龍加石膏湯

桂枝湯下

炙甘草湯

桂枝湯下

小柴胡湯

方祖

理中湯

方祖

桂枝湯

方祖

華蓋散

麻黃湯下

九寶湯

麻黃湯下

芍蘇散

傷寒門

華嗽化痰湯

二陳湯下

小建中湯

桂枝湯下

真武湯

木附湯下

濟生腎氣丸

八味丸下

葳蕤湯

傷寒門

越脾湯

麻黃湯下

古今錄驗續命湯

方祖

涼膈散

方祖

加減葱白香豉湯

傷寒門

小陷胸湯

傷寒門

麻黃加水湯

麻黃湯下

二陳湯

方祖

千緡湯

二陳湯下

千金麥門冬湯

燥門

千金五味子湯

燥門

桔梗湯

方祖

地黃煎

解門

千金地黃煎

煉門

生脈散

方祖

二冬膏

方祖

麻杏甘石湯

麻黃湯下

保元湯

方祖

蘇子降氣湯

七氣湯下

四七湯

二陳湯下

歸脾湯

保元湯下

逍遙散

虛損門

加味逍遙散

虛損門

加味導痰湯

二陳湯下

枳殼散

桔梗湯下

補中益氣湯

保元湯下

都炁丸

八味丸下

犀角地黃湯

傷寒門

平胃散

方祖

越鞠丸

鬱門

四烏鯁骨一薏茹丸

虛損門

百勞丸

虛損門

溫肺湯

七氣湯下

半夏溫肺湯

七氣湯下

參蘇溫肺湯

七氣湯下

黃耆建中湯

桂枝湯下

瓊玉膏

虛損門

加減八味丸

八味丸下

生料鹿茸丸

虛損門

門冬清肺飲

生散下

三枸湯

麻黃湯下

竹葉石膏湯

白虎湯下

五苓散

方祖

局方七氣湯

方祖

喘金丹

虛損門

童真丸

虛損門

烏骨雞丸

虛損門

大溫經湯

四物湯下

肺痿門

溫中生薑湯 千金

治肺痿虛寒噓吸胸滿

生薑 一兩

桂心

橘皮 各一兩
三錢

甘草

麻黃 各一兩

右五味以水一斗先煮麻黃兩沸去沫然後入諸

藥合煮取二升半分三服

生薑甘草湯 千金

治肺痿欬唾涎沫咽燥而渴

生薑 半兩

甘草 炙二錢

人參 三錢

大棗 五枚

右四味水煎溫服

人參蛤蚧散

治肺痿失音欬唾膿血或面上生瘡

川蛤蚧

十對酒浸酥炙色白形如守宮者真若剖開如鼠皮者假

知母

酒炒

川貝母

去心

桑白皮

薑汁和蜜炙

茯苓

各二兩

人參

甘草

炙各三兩

杏仁

去皮尖五錢

為散每服三錢不拘時茶清或蜜水調服

甘草乾薑湯

理中湯下

炙甘草湯

桂枝湯下

紫苑散

欬嗽

固本丸

二冬膏下

劫勞散 四物湯下

肺脹門

越婢加牛夏湯 麻黃湯下

小青龍加石膏湯 桂枝湯下

生脈散 方祖

保元湯 方祖

異功散 四君子湯下

都炁丸 八味丸下

局方七氣湯 方祖

肺離門

皂莢丸 金匱 治欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠

皂莢 刮去皮炙子酥炙

右一味末之。蜜九。梧子六。以棗膏和湯服。三九。日三夜一服。

葶藶湯

千金

治肺癰胸中甲錯

葶藶

卽盧管取節一升

薏苡仁

三合

桃仁

五十枚碎

瓜瓣

卽甜瓜。子半升。初如無枯。薏苡仁代之。

右四味以水一斗。先煮葶藶得五升。去滓。內諸藥。煮取二升。溫服一升。再服。當吐如膿。

皂莢。條肺胃濁垢。葶藶瀉肺下水氣。葶藶通肺絡。痰塞。治肺癰。三法。

千金桂枝去芍藥加皂莢湯桂枝湯下

桔梗湯方祖 十六味桔梗湯桔梗湯下

葶藶大聚瀉肺湯痰飲門 葶藶薤苈瀉肺湯桔梗湯下

六味丸八味丸下

瘖門

酥蜜膏酒千金 治肺氣虛寒。癰風所傷。語聲嘶塞。

欬唾上氣喘嗽。及寒鬱熱邪。聲瘖不出。

酥 崖蜜 飴糖各一

生薑汁 生百部汁 棗肉

杏仁

各半升研

相皮

五具末

右八味先將杏仁和水三升煮減半去滓入酥蜜薑飴等味文火再熬取二升溫酒調服方寸匕細細嚥之曰三服七日痰色變二七日唾稀三七日嗽止

本方去百部柑飴加通草款冬各二兩菖蒲人參苪茹各一兩五味細辛桂心各半兩名通聲膏肺竅爲風寒所襲而致喘欬上氣語聲嘶塞故用薑汁杏仁柑皮百部溫散肺絡之結膠飴棗肉乳

酥崖蜜熬膏酒服通行脾肺之津津回燥潤而聲
自復矣。於本方中除去百部柑皮之耗氣膠飴
之助壅加五味人參資肺之津欬冬竹茹清肺之
燥桂心細辛搜肺之邪通草菖蒲利肺之竅仍取
前方中酥蜜杏仁薑汁棗肉滋培津氣而通其聲
蓋酥蜜膏酒專滋脾胃之燥通聲膏專資脾肺之
津津本大腸所主故千金以此方隸諸大腸府門

消風散

門

清咽寧肺湯

湯下

二陳湯

方祖

導痰湯

二陳
湯下

生脈散 方祖

六味丸 八味丸下

都炆丸 八味丸下

異功散 四君子湯下

代抵當丸 抵當湯下

麻杏甘石湯 麻黃湯下

古今錄驗續命湯 方祖

童真丸 虛損門

十全大補湯 保元湯下

桔梗湯 方祖

麻黃附子細辛湯 麻黃湯下

喘門

麻黃蒼朮湯 治秋冬感寒至夜大喘

麻黃

羌活 各八分 蒼朮 泔浸切麻油炒

柴胡

各五分

防風

當歸

各四分

黃芩

三分

草豆蔻

炒研六分

黃耆

酒炒一錢五分

五味子

九粒碎

甘草

炙三分生四分

水煎臨卧熱服

麻黃定喘湯

治寒包熱邪哮喘痰嗽遇冷即發

麻黃

去節八分

杏仁

十四粒泡去皮尖研

厚朴

薑製八分

款冬花

去梗

桑皮

蜜炙

蘇子

微炒研各一錢

甘草

生炙各四分

黃芩

半夏

薑製各二錢二分

煎成去滓以生銀杏七枚搗爛入藥絞去滓乘熱

服之去枕仰卧暖覆取微汗勿。

人參定喘湯 局方

治遠年欬逆上氣胸滿痞塞聲

不出

人參

麻黃 去節

甘草 炙

阿膠

半夏麴 各一錢

桑白皮 蜜炙

五味子

碎各半錢

罌粟殼

蜜炙二分

生薑 三片

水煎食後服溫覆取微汗

八味丸

方祖

逍遙散

虛損

佐金丸

方相

六味丸

八味丸下

生脈散 方祖

六君子湯 四君子湯下

華蓋散 麻黃湯下

慘澤湯 理中湯下

白虎湯 方祖

二陳湯 方祖

四七湯 二陳湯下

越婢加半夏湯 麻黃湯下

小青龍加石膏湯 桂枝湯下

濟生腎氣丸 八味丸下

靈砂丹 金液丹下

蘇子降氣湯 七氣湯下

參蘇溫肺湯 七氣湯下

四磨湯 氣門

千緡湯 二陳湯下

導痰湯 二陳湯下

神保丸 傷飲食門

三拗湯 麻黃湯下

古今錄驗續命湯 方祖

九寶湯 麻黃湯下

寧嗽化痰湯 二陳湯下

短氣門

苓桂朮甘湯 桂枝湯下

腎氣丸 八味丸下

小青龍湯 桂枝湯下

厚朴大黃湯 承氣湯下

四君子湯 方祖

生脈散 方祖

少氣門

獨參湯 保元湯下

生脈散 方祖

保元湯 方祖

異功散 四君子湯下

逆氣門

四磨湯 氣門

七氣湯 方劑

蘇子降氣湯 七氣湯下

越脾湯 麻黃湯下

杏子湯 麻黃湯下

小青龍湯 桂枝湯下

麻黃附子細辛湯 麻黃湯下

腎氣丸 八味丸下

靈砂丹 金液丹下

勞門

鐘乳丸 治冷哮喘但有血者服

滴乳石 酒淫研七日水飛七次甘草湯煮三伏時蘸少許擦開光如鱗魚為度

麻黃

醋湯泡
焙乾

杏仁

揀去雙仁
泡去皮尖

甘草

炙等分

煉白蜜丸彈子大五更臨卧各嚙化一九去枕仰卧勿開言數日効。

此卽麻黃湯去桂枝麻杏甘石湯去石膏而易鐘乳互換一味寒熱天淵○本草言服鐘乳人一生忌朮以石藥慄悍白朮壅滯犯之恐有暴絕之虞而千金方有二味竝用者又非庸工可以測識也

冷哮丸 治背受寒氣遇冷卽發喘嗽頑痰結聚胸膈痞滿倚息不得卧。

麻黃泡

川烏生

細辛

蜀椒

白礬生

牙皂去皮弦子酥炙

半夏麴

陳膽星

杏仁去雙仁者連皮尖用

甘草生各一兩

紫菀茸

款冬花各二兩

右爲細末薑汁調神麴末打糊爲丸每遇發時臨

卧生薑湯服二錢羸者一錢更以三建膏貼肺俞

穴中服後時吐頑痰胸膈自寬服此數日後以補

脾肺藥調之候發如前再服

按此少變麻黃附子細辛湯之法而合稀涎散以

涌泄其痰開發肺氣之剛劑但氣虛少食及痰中見血營氣受傷者禁用以其專司疎泄而無溫養之功也。觀方下所云服此數日後以補脾肺藥調之。候發如前再服。擒縱緩急之妙盡在乎此。

三建膏 治陰疽反肉不化

天雄

附子

川烏

各一
枚

桂心

觀桂

桂枝

細辛

乾薑

蜀椒

各二
兩

一右切爲片。麻油二觔浸春五夏三秋七冬十日煎。

熬去滓搥淨再熬徐下黃丹不住手攪滴水不散
爲度陰疽以葱湯洗淨攤成加銀粉少許貼患處
腹痛少食泄瀉攤成加丁香末少許貼臍中及中
脘陽衰精冷攤成加阿芙蓉少許貼臍中及丹田
冷哮喘嗽攤成加麝少許貼肺俞及華蓋膻中癰
瘰冷積攤成加麝香阿魏少許貼患處

小青龍湯

桂枝湯下

溫肺湯

七氣湯下

越脾加朮湯

麻黃湯下

蘆吸散

欬嗽門

滾痰丸

痰飲門